

## 子宮収縮止血剤

日本薬局方

メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠

劇薬

処方箋医薬品<sup>注)</sup>

メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」

METHYLERGOMETRINE TABLETS

日本標準商品分類番号

872531

承認番号

22200AMX00004

販売開始

1971年5月

貯法：室温保存

有効期間：3年

注) 注意—医師等の処方箋により使用すること

## 2. 禁忌 (次の患者には投与しないこと)




- 2.1 妊婦又は妊娠している可能性のある女性 [9.5参照]  
 2.2 児頭娩出前 [子宮破裂、胎児死亡のおそれがある。]  
 2.3 本剤又は麦角アルカロイドに対し過敏症の既往歴のある患者  
 2.4 重篤な虚血性心疾患又はその既往歴のある患者 [冠動脈の攣縮により、狭心症、心筋梗塞が誘発されることがある。] [11.1.2参照]  
 2.5 敗血症の患者 [血管収縮に対する感受性が増大し、症状が悪化するおそれがある。]  
 2.6 HIVプロテアーゼ阻害剤 (リトナビル、アタザナビル、ホスアンプレナビル、ダルナビル)、エファビレンツ、アゾール系抗真菌薬 (イトラコナゾール、ボリコナゾール、ボサコナゾール)、コピシスタット含有製剤、ニルマトレルビル・リトナビル、レテルモビル、エンシトレルビル、5-HT<sub>1B/1D</sub>受容体作動薬 (スマトリプタン、ゾルミトリプタン、エレトリプタン、リザトリプタン、ナラトリプタン)、エルゴタミン・無水カフェイン・イソプロピルアンチピリンを投与中の患者 [10.1参照]

## 3. 組成・性状

## 3.1 組成

販売名	メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」
有効成分	1錠中 日局メチルエルゴメトリンマレイン酸塩0.125mg
添加剤	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、部分アルファー化デンプン、マレイン酸、硬化油、ステアリン酸亜鉛、ヒプロメロース、ヒドロキシプロピルセルロース、タルク、酸化チタン、マクロゴール6000、カルナウパロウ

## 3.2 製剤の性状

販売名	メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」		
剤形	白色フィルムコーティング錠		
外形	表	側面	裏
			
	直径約6.6mm 厚さ約2.9mm 質量約102mg		
識別コード	TZ157		

## 4. 効能又は効果

子宮収縮の促進並びに子宮出血の予防及び治療の目的で次の場合に使用する。

胎盤娩出後、子宮復古不全、流産、人工妊娠中絶

## 6. 用法及び用量

メチルエルゴメトリンマレイン酸塩として、通常成人1回0.125～0.25mgを1日2～4回経口投与する。

なお、症状により適宜増減する。

## 9. 特定の背景を有する患者に関する注意

## 9.1 合併症・既往歴等のある患者

## 9.1.1 高血圧症、妊娠高血圧症候群又は子癇の患者、心疾患又は閉塞性血管障害のある患者

血管収縮作用により、これらの症状が悪化するおそれがある。

## 9.2 腎機能障害患者

## 9.2.1 腎疾患のある患者

本剤の代謝・排泄が遅延するおそれがある。

## 9.3 肝機能障害患者

## 9.3.1 肝疾患のある患者

本剤の代謝・排泄が遅延するおそれがある。

## 9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には投与しないこと。子宮収縮作用により、子宮内胎児への悪影響、流産のおそれがある。[2.1参照]

## 9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。母乳中へ移行することが報告されている。

## 10. 相互作用

本剤は主にCYP3A4で代謝される。

## 10.1 併用禁忌 (併用しないこと)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
* HIVプロテアーゼ阻害剤 リトナビル (ノービア) アタザナビル (レイアタツ) ホスアンプレナビル (レクシヴァ) ダルナビル (プリジスタ・プリジスタナイブ) エファビレンツ (ストックリン) アゾール系抗真菌薬 イトラコナゾール (イトリゾール) ボリコナゾール (ブイフェンド) ボサコナゾール (ノクサフィル) コピシスタット含有製剤 (スタリビルド)	本剤の血中濃度が上昇し、血管攣縮等の重篤な副作用を起こすおそれがある。	本剤での報告はないが、CYP3A4の競合阻害により、本剤の代謝が阻害されるおそれがある。
* ニルマトレルビル・リトナビル (バキロビッド) [2.6参照]		CYP3A4の阻害作用により、本剤の代謝が阻害されるおそれがある。
** レテルモビル (プレバイミス) エンシトレルビル (ゾコーバ) [2.6参照]		
5-HT <sub>1B/1D</sub> 受容体作動薬 スマトリプタン (イミグラン) ゾルミトリプタン (ゾーミック) エレトリプタン (レルパックス) リザトリプタン (マクサルト) ナラトリプタン (アマージ) エルゴタミン・無水カフェイン・イソプロピルアンチピリン (クリアミン) [2.6参照]	血圧上昇又は血管攣縮が増強されるおそれがある。なお、5-HT <sub>1B/1D</sub> 受容体作動薬と本剤を前後して投与する場合は24時間以上の間隔をあけて投与すること。	これらの薬剤との薬理的相加作用により、相互に作用 (血管収縮作用) を増強させる。

## 10.2 併用注意 (併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
プロモクリプチン	血圧上昇、頭痛、痙攣等があらわれるおそれがある。	機序は明確ではないが、相互に血管収縮作用、血圧上昇作用を増強すると考えられる。

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
マクロライド系抗生物質 エリスロマイシン クラリスロマイシン シメチジン キヌプリスチン・ダルホ プリスチン ステリパントール グレープフルーツジュース	本剤の血中濃度が上昇し、血管攣縮等の重篤な副作用を起こすおそれがある。	本剤での報告はないが、CYP3A4の競合阻害により、本剤の代謝が阻害されるおそれがある。
ネビラピン リファンピシン	本剤の血中濃度が低下し、効果が減弱するおそれがある。	これらの薬剤はCYP3A4を誘導することから本剤の代謝が促進されると考えられる。

## 11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

### 11.1 重大な副作用

#### 11.1.1 アナフィラキシー（頻度不明）

#### 11.1.2 心筋梗塞、狭心症、冠動脈攣縮、房室ブロック（いずれも頻度不明）

[2.4参照]

### 11.2 その他の副作用

	頻度不明
過敏症	発疹等
循環器	動悸、頻脈、徐脈、胸痛、胸部圧迫感、血圧上昇、血圧低下等
血管系	静脈血栓、末梢循環障害、血管痙攣
精神神経系	頭痛、めまい、眠気、痙攣、耳鳴、幻覚、興奮、口渇、錯感覚等
消化器	悪心、嘔吐、下痢、腹痛等
筋・骨格系	筋痙攣
その他	胎盤嵌頓、多汗

## 13. 過量投与

### 13.1 症状

悪心、嘔吐、腹痛、しびれ感、手足の刺痛感、血圧上昇、血圧低下、呼吸抑制、低体温、痙攣、昏睡等を生じることがある。

## 14. 適用上の注意

### 14.1 薬剤交付時の注意

PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することがある。

## 16. 薬物動態

### 16.1 血中濃度

体重9.0～14.5kgの雄ビーグル犬にメチルエルゴメトリンマレイン酸塩0.5mg/匹を経口投与した結果、血漿中メチルエルゴメトリン濃度は0.7～1.1時間で最高に達し（82～92ng/mL）、半減期は1.5～1.8時間であった<sup>1)</sup>。

## 18. 薬効薬理

### 18.1 作用機序

本剤は子宮平滑筋に選択的に作用して子宮を持続的に収縮させ、子宮血管を圧迫して止血効果を発現する。また、分娩第Ⅲ期（胎盤娩出期）を短縮させ、子宮出血量を減少させる。

### 18.2 子宮収縮作用

本剤の子宮収縮作用はエルゴメトリンよりやや強く、作用持続時間も長い<sup>2)</sup>が、血圧上昇作用はエルゴメトリン、エルゴタミンより弱い<sup>2)-5)</sup>。

作用発現は経口投与で3～5分、静脈内注射で0.5～1分、筋肉内注射で2～5分で、作用持続時間は3～6時間である<sup>2),3)</sup>。

## 19. 有効成分に関する理化学的知見

一般的名称：メチルエルゴメトリンマレイン酸塩

(Methylethylergometrine Maleate)

化学名：(8*R*)-*N*-[(1*S*)-1-(Hydroxymethyl)propyl]-6-methyl-9,10-didehydroergoline-8-carboxamide monomaleate

分子式：C<sub>20</sub>H<sub>25</sub>N<sub>3</sub>O<sub>2</sub>・C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>O<sub>4</sub>

分子量：455.50


性状：白色～微黄色の結晶性の粉末で、においはない。

水、メタノール又はエタノール（95）に溶けにくく、ジエチルエーテルにほとんど溶けない。

光によって徐々に黄色となる。

融点：約190℃（分解）

化学構造式：



## 20. 取扱い上の注意

外箱開封後は遮光して保存すること。

## 22. 包装

100錠 [10錠(PTP)×10]

1,000錠 [10錠(PTP)×100]

## 23. 主要文献

- 1) 藤方 明他:医薬品研究.1991;22(4):703-713
- 2) Osol,A.et al.:The United States Dispensatory,27th Ed.(J.B.Lippincott,Philadelphia)1973:p.745-746
- 3) 田中 潔:現代の薬理学.金原出版;1984.p.394-405
- 4) Goth,A.:Medical Pharmacology,5th Ed.丸善;1971.p.462-464
- 5) Landesman,R.et al.:Am.J.Obstet.Gynecol.1956;72(1):84-92

## 24. 文献請求先及び問い合わせ先

あすか製薬株式会社 くすり相談室  
〒108-8532 東京都港区芝浦二丁目5番1号  
TEL 0120-848-339  
FAX 03-5484-8358

## 26. 製造販売業者等

### 26.1 製造販売元

**あすか製薬株式会社**

東京都港区芝浦二丁目5番1号

### 26.2 販売元

**武田薬品工業株式会社**

大阪市中央区道修町四丁目1番1号