

◀ 日本薬局方 ▶ '90.7.26

イソプロパノール「カナダ」

ISOPROPANOL 50%

火気厳禁

製造発売元
合名会社金田直隆商店
大阪市中央区道修町1丁目4番3号
N.KANADA & CO.,



Lot.

【用法及び用量】

通常イソプロパノールとして、50~70%液を用いる。

【効能又は効果】

手指・皮膚の消毒、医療用具の消毒

【使用上の注意】

- (1) 次の部位には使用しないこと
損傷皮膚及び粘膜(刺激作用を有するので)
- (2) 副作用
 - 1) 過敏症 発疹等の過敏症状があらわれることがあるので、このような場合には使用を中止すること。
 - 2) 皮膚 刺激症状があらわれることがあるので、このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。
- (3) 臨床検査値への影響
注射部位に発赤を起こすことがあるので、アレルギーテストの判断を妨害することがある。
- (4) 適用上の注意
 - 1) 人 体
 - ア. 外用にのみ使用すること。
 - イ. 眼に入らないよう注意すること。入った場合は水でよく洗い流すこと。
 - ウ. 広範囲又は長期間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。
 - エ. 同一部位に反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。
 - 2) その他
本剤は血清、涙液等のたん白質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している医療器具等に用いる場合には、十分に洗い落してから使用すること。

◀ 日本薬局方 ▶ '90.7.26

16L

イソプロパノール「カナダ」

ISOPROPANOL 50%

火気厳禁

製造発売元
合名会社金田直隆商店
大阪市東区道修町1丁目12
N.KANADA & CO.,



Lot.

【用法及び用量】

通常イソプロパノールとして、50~70%液を用いる。

【効能又は効果】

手指・皮膚の消毒、医療用具の消毒

【使用上の注意】

- (1) 次の部位には使用しないこと
損傷皮膚及び粘膜(刺激作用を有するので)
- (2) 副作用
 - 1) 過敏症 発疹等の過敏症状があらわれることがあるので、このような場合には使用を中止すること。
 - 2) 皮膚 刺激症状があらわれることがあるので、このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。
- (3) 臨床検査値への影響
注射部位に発赤を起こすことがあるので、アレルギーテストの判断を妨害することがある。
- (4) 適用上の注意
 - 1) 人 体
 - ア. 外用にのみ使用すること。
 - イ. 眼に入らないよう注意すること。入った場合は水でよく洗い流すこと。
 - ウ. 広範囲又は長期間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。
 - エ. 同一部位に反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。
 - 2) その他
本剤は血清、涙液等のたん白質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している医療器具等に用いる場合には、十分に洗い落してから使用すること。