

◀ 日本薬局方 ▶

500ml

(劇) ホルマリン 「カナダ」

FORMALINUM



Lot.

製造発売元

合名会社 金田直隆商店

大阪市中央区道修町1丁目4番3号

N.KANADA & CO.,



'90.7.28

日本標準商品分類番号 817321

【用法及び用量】

医療用具の消毒、手術室・病室・家具・器具・物品などの消毒。  
使用対象により、通常、つぎのいずれかの方法を用いる。

- 1) ホルムアルデヒド1~5%溶液による浸漬、又は清拭を行い、2時間以上放置する。
- 2) ガス消毒法：気密容器中あるいは密閉環境内において、容積1m<sup>3</sup>に対しホルマリン15ml以上(ホルムアルデヒドとして6g以上)を水40ml以上とともに噴霧又は蒸発させ、7~24時間又はそれ以上放置する。  
蒸発を速めるためには、ホルマリン15ml以上を希釈(5~10%)し加熱沸騰させる方法、ホルマリン15ml以上に対し水40ml以上及び過マンガン酸カリウム18~20gを加える方法などを用いる。

【効能又は効果】

医療用具の消毒、手術室・病室・家具・器具・物品などの消毒。

【使用上の注意】

適用上の注意

- 1) 誤飲を避けるため、保管及び取扱いは十分注意すること。
- 2) 皮膚、粘膜(目、鼻、咽喉等)に刺激作用があるので皮膚、粘膜に付着しないようにすること。付着した場合には多量の水で洗い流すこと。目の場合は、水洗後直ちに専門医の処置を受けること。
- 3) 蒸気は呼吸器等の粘膜に刺激作用があるので、吸入を避けること。
- 4) 消毒後、残留するホルムアルデヒドは適切な方法で除去すること。  
(例えば、水洗、アンモニア水の散布、蒸発等)