

2008年7月改訂(第5版)
(販売名併記、新コード併記)
2005年6月改訂(第4版)
(薬事法改正による表示変更)
【貯法】：しゃ光・気密容器
【使用期限】：製造の翌月から3年
【注意】：取扱以上の注意の項参照

日本標準商品分類番号 872615

承認番号 16009AMZ05462
薬価収載 2008年7月
販売開始 1955年9月
再評価結果 1982年8月

消毒用エタノール「東豊」
日本薬局方 消毒用エタノール
Ethanol for Disinfection

500mL

減容ポリ容器

満すことにより容量を約1/4に低減します

製造販売元 **東豊薬品株式会社**
東京都葛飾区西新小岩4-15-3

製造番号：
使用期限：

外皮用殺菌消毒剤

【禁忌】：(次の部位には使用しないこと)：
損傷皮膚及び粘膜【刺激作用を有する】

【組成・性状】：
組成：1mL中 エタノール 830μL
性状：本品は無色澄明の液で、特異なおい及びやくような味がある。

【効能・効果】：
手指・皮膚の消毒、手術部位(手術野)の皮膚の消毒、医療機器の消毒

【用法・用量】：
本品をそのまま消毒部位に塗布する。

【使用上の注意】
1. 重要な基本的注意
本剤は血清、膿汁等の蛋白質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している医療器具等に用いる場合には、十分に洗い落としてから使用すること。
2. 副作用：
本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。
その他の副作用

	頻度不明
過敏症注)	発疹等
皮膚注)	刺激症状

注)：このような場合には使用を中止すること。

3. 適用上の注意：
人体：
ア. 原液又は濃厚液は刺激作用があるので経口投与しないこと。
イ. 眼に入らないように注意すること、入った場合には水でよく洗い流すこと。
ウ. 広範囲又は長期間使用する場合、蒸気の吸入に注意すること。
エ. 同一部位に反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。

4. その他の注意：
承認外の経皮的エタノール注入療法(PEIT)使用例で、注入時の疼痛、酸酩感、発熱、本剤の局所外流出による篤篤な胆道・腹腔内等での出血、肝梗塞、肝不全等が報告されている。

【薬効薬理】：
本剤は、使用濃度において栄養型細菌(グラム陽性菌、グラム陰性菌)、酵母類、ウイルス等には有効であるが、芽胞(炭疽菌、破傷風菌等)及び一部のウイルスに対する殺菌効果は期待出来ない。

【取扱い上の注意】：
1. 金属器具を長時間浸漬する必要がある場合には、腐蝕を防止するために0.2~1.0%の亜硝酸ナトリウムを添加すること。
2. 合成ゴム製品、合成樹脂製品、光学器具、鏡器具、塗装カテーテル等には、変質するものがあるので、このような器具は長時間浸漬しないこと。

【注意】：
【火気厳禁】 アルコール類、水溶性、危険等級Ⅱ



JAN GSI-RSS

4 987429 000940

(01) 14867429000947