

日本薬局方 **山梔子末**

薬価基準収載
16000AMZ01521000

GS1 調剤



ウチダのサンシシ末M

効能・効果 漢方処方調剤に用いる。 使用期限：

用法・用量 漢方処方調剤に用いる。

GS1 販売



容量：500g Lot.

貯法：日光を避け、湿気の少ない場所に保存してください。

〈使用上の注意〉

重要な基本的注意


- (1) 本剤の使用にあたっては、漢方処方における患者の証(体質・症状)を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。
- (2) サンシン含有製剤の長期投与(多くは5年以上)により、大腸の色調異常、浮腫、びらん、潰瘍、狭窄を伴う腸間膜静脈硬化症があらわれるおそれがある。長期投与する場合には、定期的にCT、大腸内視鏡等の検査を行うことが望ましい。
- (3) 漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。

副作用

(1) 重大な副作用

症状の名称	症 状
腸間膜静脈硬化症	長期投与により、腸間膜静脈硬化症があらわれることがある。腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれた場合、又は便潜血陽性になった場合には投与を中止し、CT、大腸内視鏡等の検査を実施するとともに、適切な処置を行うこと。なお、腸管切除術に至った症例も報告されている。

株式会社ウチダ和漢薬 東京都荒川区東日暮里4-3-3

 取扱い上の注意

1. 天産物（生薬）の性質上吸湿しやすいものがありますので、保存には十分ご注意ください。保存が悪いと、カビ、虫害等の発生する原因になることがあります。
2. 特に開封後は、湿気を避け、直射日光の当たらない涼しい場所に保管してください。
3. 本品には品質保持の目的で窒素ガス（不活性ガス）、脱酸素剤、乾燥剤等を生薬の特質に応じて封入しております。脱酸素剤、乾燥剤等の場合は、一緒に煎じたり、食べたりしないようご注意ください。
4. 製品の品質には細心の注意を払っておりますが、お気づきの点がございましたら弊社までご連絡ください。

MQA



PE,PET