

品名 ウチダのサンシシM

ラベル

日本薬局方 山 梔 子		薬価基準収載 16000AMZ01520000
ウチダのサンシシM 中国産		GST 調剤
効能・効果 漢方処方調剤に用いる。		(01)04987359864315
用法・用量 漢方処方調剤に用いる。		GST 販売
容量 : 500g Lot. ???0206		(17) ?????? (10) ???????
貯法 : 日光をさけ、湿気の少ない場所に保管してください。		(01)14987359864305
重要な基本的注意		使用期限 : ???????
＜使用上の注意＞		
(1) 本剤の使用にあたっては、漢方処方における患者の証(体質・症状)を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。		
(2) サンシシ含有製剤の長期投与(多くは5年以上)により、大腸の色調異常、浮腫、びらん、潰瘍、狭窄を伴う腸間膜静脈硬化症があらわれるおそれがある。長期投与する場合にあつては、定期的にCT、大腸内視鏡等の検査を行うことが望ましい。		
(3) 漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。		
副作用 (1) 重大な副作用		
症状の名称	症 状	
腸間膜静脈硬化症	長期投与により、腸間膜静脈硬化症があらわれることがある。腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれた場合、又は使済血腫性になった場合には投与を中止し、CT、大腸内視鏡等の検査を実施するとともに、適切な処置を行うこと。なお、腸管切除術に至った症例も報告されている。	
株式会社ウチダ和漢薬 新潟県上越市大潟区蜘蛛池1755-3		
脱酸素剤封入	サンシシ	製品情報は こちら

容器

保管及び取扱い上の注意

1. 天然物(生薬)の性質上、吸湿しやすいものがありますので、保存には十分ご注意ください。保存が悪いと、カビ、虫害等が発生する原因になることがあります。
2. 特に開封後は、湿気を避け、直射日光の当たらない涼しい場所に保管してください。
3. 本品には品質保持の目的で脱酸素剤、乾燥剤等を生薬の特質に応じて封入しておりますので、一緒に煎じたりしないようご注意ください。
4. 製品の品質には細心の注意を払っておりますが、お気づきの点がございましたら弊社までご連絡ください。

ラベル

<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 日本薬局方 山 梔 子 </div> <p>ウチダのサンシシM 中国産 上</p> <p>効能・効果 漢方処方調剤に用いる。</p> <p>用法・用量 漢方処方調剤に用いる。</p> <p>容量：500g Lot. ???0250</p> <p>貯法：日光を避け、湿気の少ない場所に保管してください。</p> <p>重要な基本的注意 <使用上の注意> 使用期限：???????</p> <p>(1) 本剤の使用にあたっては、漢方処方における患者の証(体質・症状)を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。</p> <p>(2) サンシシ含有製剤の長期投与(多くは5年以上)により、大腸の色調異常、浮腫、びらん、潰瘍、狭窄を伴う腸間膜静脈硬化症があらわれるおそれがある。長期投与する場合には、定期的にCT、大腸内視鏡等の検査を行うことが望ましい。</p> <p>(3) 漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。</p> <p>副作用 (1) 重大な副作用</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">症状の名称</th> <th>症 状</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>腸間膜静脈硬化症</td> <td>長期投与により、腸間膜静脈硬化症があらわれることがある。腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれた場合、又は便潜血陽性になった場合には投与を中止し、CT、大腸内視鏡等の検査を実施するとともに、適切な処置を行うこと。なお、腸管切除術に至った症例も報告されている。</td> </tr> </tbody> </table>	症状の名称	症 状	腸間膜静脈硬化症	長期投与により、腸間膜静脈硬化症があらわれることがある。腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれた場合、又は便潜血陽性になった場合には投与を中止し、CT、大腸内視鏡等の検査を実施するとともに、適切な処置を行うこと。なお、腸管切除術に至った症例も報告されている。	<p>薬価基準収載 16000AMZ01520000</p> <p>GS1 調剤</p>  <p>(01)04987359722318</p> <p>GS1 販売</p> <p>(17) ?????? (10) ????????</p>  <p>(01)14987359722308</p>
症状の名称	症 状				
腸間膜静脈硬化症	長期投与により、腸間膜静脈硬化症があらわれることがある。腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれた場合、又は便潜血陽性になった場合には投与を中止し、CT、大腸内視鏡等の検査を実施するとともに、適切な処置を行うこと。なお、腸管切除術に至った症例も報告されている。				
<p>株式会社ウチダ和漢薬 新潟県上越市大潟区蜘蛛ヶ池1755-3</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">脱酸素剤封入</div> <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; font-size: 2em; font-weight: bold;">サンシシ</div> <div style="text-align: center;">  <p>製品情報は こちら</p> </div> </div>					

容器

保管及び取扱い上の注意

1. 天然物(生薬)の性質上、吸湿しやすいものがありますので、保存には十分ご注意ください。保存が悪いと、カビ、虫害等が発生する原因になることがあります。
2. 特に開封後は、湿気を避け、直射日光の当たらない涼しい場所に保管してください。
3. 本品には品質保持の目的で脱酸素剤、乾燥剤等を生薬の特質に応じて封入しておりますので、一緒に煎じたりしないようご注意ください。
4. 製品の品質には細心の注意を払っておりますが、お気づきの点がございましたら弊社までご連絡ください。

ラベル

日本薬局方 山 梔 子		薬価基準収載 16000AMZ01520000
ウチダのサンシシM 中国産 皮去		GS1 調剤
効能・効果 漢方処方調剤に用いる。		(01)04987359764417
用法・用量 漢方処方調剤に用いる。		GS1 販売
容量 : 500g Lot. ???0251		(17)000000(10)000000
		(01)14987359764407
		使用期限 : ???????
貯法 : 日光を避け、湿気の少ない場所に保管してください。		
重要な基本的注意 <使用上の注意>		
(1) 本剤の使用にあたっては、漢方処方における患者の証(体質・症状)を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。		
(2) サンシシ含有製剤の長期投与(多くは5年以上)により、大腸の色調異常、浮腫、びらん、潰瘍、狭窄を伴う腸間膜静脈硬化症があらわれるおそれがある。長期投与する場合には、定期的にCT、大腸内視鏡等の検査を行うことが望ましい。		
(3) 漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。		
副作用 (1) 重大な副作用		
症状の名称	症 状	
腸間膜静脈硬化症	長期投与により、腸間膜静脈硬化症があらわれることがある。腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれた場合、又は便潜血陽性になった場合には投与を中止し、CT、大腸内視鏡等の検査を実施するとともに、適切な処置を行うこと。なお、腸管切除術に至った症例も報告されている。	
株式会社ウチダ和漢薬 新潟県上越市大潟区蜘蛛池1755-3		
脱酸素剤封入	サンシシ	製品情報は こちら

容器

保管及び取扱い上の注意

1. 天然物(生薬)の性質上、吸湿しやすいものがありますので、保存には十分ご注意ください。保存が悪いと、カビ、虫害等が発生する原因になることがあります。
2. 特に開封後は、湿気を避け、直射日光の当たらない涼しい場所に保管してください。
3. 本品には品質保持の目的で脱酸素剤、乾燥剤等を生薬の特質に応じて封入しておりますので、一緒に煎じたりしないようご注意ください。
4. 製品の品質には細心の注意を払っておりますが、お気づきの点がございましたら弊社までご連絡ください。