

※ 2008年7月改訂（第2版）
2000年11月作成
日本標準商品分類番号 872615

承認番号 (61AM)1512
薬価収載 1986年3月
販売開始 1986年3月
再評価結果 1983年4月

（ノ左側面より続く）

4. 適用上の注意

(1) 人体

- 1) 投与経路：外用にのみ使用すること。
- 2) 使用時：同一部位（皮膚面）に反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので、注意すること。

(2) その他

使用時：血清、膿汁等の蛋白質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している医療器具等に用いる場合には、十分に洗い落してから使用すること。

〔取扱い上の注意〕

〈注意〉

引火性、爆発性があるため、火気（電気メス使用等も含む）には十分注意すること。

外用殺菌消毒剤

日本薬局方

イソプロパノール

イソプロパノール「ケンエー」

アルコール類＊水溶性＊危険等級Ⅱ＊火気厳禁



500mL

飲用不可

貯法：気密容器
火気を避けて
室温保存

注意：「取扱い上の注意」
の項参照



健栄製薬株式会社
大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号 06(6231)5626

ガラス：瓶



キャップ：PP
バックン：PE,PP
ラベル：PS,PET

〈標準包装単位用コード〉
011111101111

〈標準包装単位用コード〉
011111101111

製造番号

使用期限

〔禁忌（次の部位には使用しないこと）〕

損傷皮膚及び粘膜 [損傷皮膚及び粘膜への使用により、刺激作用を有する。]

〔組成・性状〕

1 mL中 日局イソプロパノール 1 mL含有。
〔イソプロパノール (C₃H₈O) 99 vol%以上を含有。〕
無色澄明の液で、特異なおいがある。

※〔効能・効果〕

手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒

〔用法・用量〕

通常イソプロパノールとして、50～70%液を用いる。

〔使用上の注意〕

1. 重要な基本的注意

- (1) 眼に入らないように注意すること。
眼に入った場合には水でよく洗い流すこと。
- (2) 広範囲又は長期間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。

2. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

- (1) 過敏症：発疹等の過敏症状（頻度不明）があらわれることがあるので、このような場合には使用を中止し、適切な処置を行うこと。
- (2) 皮膚：刺激症状（頻度不明）があらわれることがあるので、このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。
3. 臨床検査結果に及ぼす影響
注射部位に発赤を起こすことがあるので、アレルギーテストの判断を妨害することがある。

（右側面へ続くノ）