

500g

センブリ・重曹散「コザカイ・M」

2018年3月作成(第1版)

日本標準商品分類番号	872333
承認番号	16000AMZ04505
薬価収載	1967年5月
販売開始	2018年4月
再評価結果	1990年3月

貯法：密閉容器、室温保存
使用期限：3年(表示の使用期限を参照すること。)

●禁忌(次の患者には投与しないこと)

- (1)ナトリウム摂取制限を必要とする患者(高ナトリウム血症、浮腫、妊娠高血圧症候群等)[ナトリウムの貯留増加により、症状が悪化するおそれがある。]
- (2)ヘキサミンを投与中の患者(「相互作用」の項参照)

●組成・性状

100g中 日局 センブリ末 3g
日局 炭酸水素ナトリウム、70g
及び添加物として日局 バレイショデンプン 含有。
本品は淡灰黄色で、味は苦い。

●効能・効果

下記消化器症状の改善
食欲不振、胃部不快感、胃もたれ、嘔気・嘔吐

●用法・用量

通常、成人1回0.5～1.0g、1日3回経口投与する。
なお、年齢、症状により適宜増減する。

●使用上の注意

1.慎重投与(次の患者には慎重に投与すること)

- (1)重篤な消化管潰瘍のある患者[炭酸水素ナトリウムを配合しているため、症状が悪化するおそれがある。]
- (2)腎障害のある患者[ナトリウムの貯留による浮腫があらわれるおそれがある。]
- (3)心不全の患者、高血圧症の患者[ナトリウム過剰により、これらの症状が悪化するおそれがある。]
- (4)肺機能障害のある患者[呼吸性アルカローシスになるおそれがある。]
- (5)低クロル性アルカローシス等の電解質失調の患者[症状が悪化するおそれがある。]

2.相互作用

(1)併用禁忌(併用しないこと)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ヘキサミン ヘキサミン 静注液	本剤はヘキサミンの効果を減弱させることがある。	ヘキサミンは酸性尿中でホルムアルデヒドとなり抗菌作用を発現するが、本剤は尿のpHを上昇させヘキサミンの効果を減弱させる。

(2)併用注意(併用に注意すること)

本剤は制酸作用等を有しているため、他の薬剤の吸収・排泄にも影響を与えることがある。

3.高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているため、減量するなど注意すること。

●有効成分に関する理化学的見聞

1.センブリ末

灰黄緑色～黄褐色を呈し、わずかににおいがあり、味は極めて苦く、残留性である。

2.炭酸水素ナトリウム

一般名：炭酸水素ナトリウム、重曹、重炭酸ナトリウム
(Sodium Bicarbonate)

分子式：NaHCO₃

性状：白色の結晶又は結晶性の粉末で、においはなく、特異な塩味がある。
水にやや溶けやすく、エタノール(96)又はジエチルエーテルにほとんど溶けない。
湿った空气中で徐々に分解する。


●文献請求先

丸石製薬株式会社 学術情報部
〒538-0042 大阪市鶴見区今津中2-4-2
TEL. 0120-014-561

500g

センブリ・重曹散 「コザカイ・M」

MARUISHI



開口

健胃消化剤

センブリ・重曹散 「コザカイ・M」

Swertia and Sodium Bicarbonate Powder

日本薬局方

センブリ・重曹散

発売元

丸石製薬株式会社
大阪市鶴見区今津中2-4-2

製造販売元

小堺製薬株式会社
東京都墨田区両国4-36-9



箱



袋:PE