

## 外皮用収斂・消炎剤

日本薬局方 酸化亜鉛

<貯法> 気密容器

# 酸化亜鉛「コザカイ・M」

(亜鉛華)

Zinc Oxide

### 【禁忌】(次の部位には使用しないこと)

1. 重度又は広範囲の熱傷 [酸化亜鉛が創傷部位に付着し、組織修復を遷延させることがある。]

\*\*2. 患部が湿潤している場合 [酸化亜鉛が創傷部位に付着し、組織修復を遷延させることがある。]

### 【組成・性状】

本品1g中に、日本薬局方酸化亜鉛1gを含有する。  
本品は白色の無晶性の粉末で、におい及び味はない。

### 【効能・効果】

軽度の皮膚病変の収斂・消炎・保護・緩和な防腐

### 【用法・用量】

外用散剤(散布剤)として15～100%  
軟膏剤・液剤(懸濁剤・リニメント剤・ローション剤等)として2～60%  
上記濃度に調製し、いずれも症状に応じ1日1～数回患部に適用する。

### 【使用上の注意】

#### (1) 副作用

本剤は、使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

種類\頻度	頻度不明
過敏症 <sup>注)</sup>	過敏症状
皮膚 <sup>注)</sup>	発疹、刺激感等

注) このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

#### (2) 適用上の注意

- 1) 誤って吸入しないように注意させること。
- 2) 眼には使用しないこと。

### 【薬効薬理】

皮膚の蛋白質と結合して被膜を形成し、収斂、消炎、保護ならびに緩和な防腐作用を現す。  
また、滲出液の吸収および分泌抑制により、創面または潰瘍面等を乾燥させる。

### 【有効成分に関する理化学的知見】

一般名：酸化亜鉛、亜鉛華

化学名：Zinc Oxide

分子式：ZnO

\*\* 分子量：81.38

\*\* 性状：本品は白色の無晶性の粉末で、におい及び味はない。

本品は水、エタノール(95)、酢酸(100)又はジエチルエーテルにほとんど溶けない。

本品は希塩酸又は水酸化ナトリウム試液に溶ける。

本品は空気中で徐々に二酸化炭素を吸収する。

### 【包装】

500g

\* 製造販売元



小堀製薬株式会社

\*\* 東京都墨田区両国 4-36-9