



TRADE MARK



日本薬局方 500mL トウガラシチンキ

火気厳禁 アルコール類
水溶性 危険等級Ⅱ

Capsicum Tincture



小堺製薬株式会社 東京都墨田区両国4-36-9

2012年4月 第1版 作成

(貯法)

保存条件: 遮光して保存する。

容 器: 気密容器

販売名: トウガラシチンキ「コザカイ・M」

日本標準商品分類番号 872649

承認番号 16000AMZ04507000

薬価収載 1967年7月

販売開始 1967年7月

再評価結果 1982年1月

皮膚刺激剤

【禁忌】(次の部位には使用しないこと)

- 1) び爛・創傷皮膚および粘膜
- 2) 眼又は眼の周囲[刺激作用を有するので]

【組成・性状】

本品	1,000mL中
日局	トウガラシ、中切 100g
日局	エタノール 適量
計 1000mL	

以上をとり、チンキ剤の製法により製する。
本品は黄赤色の液で、味はやくように辛い。

【効能・効果】

皮膚刺激剤として下記に用いる。
筋肉痛、凍瘡、凍傷(第1度)、育毛

【用法・用量】

筋肉痛、凍瘡、凍傷(第1度)には、トウガラシチンキとして、通常、10～40%を添加した液剤、軟膏剤、硬膏剤又はパップ剤を1日1～数回局所に塗布する。
育毛には、トウガラシチンキとして、通常、1～4%を添加した液剤を1日1～数回局所に塗擦する。

【使用上の注意】

(1) 副作用

本剤は、使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

種類\頻度	頻度不明	注)これらの症状が強くあらわれた場合には、濃度を下げるなど適切な処置を行うこと。
皮膚注)	刺激感、疼痛等	

(2) 適用上の注意

- 1) 原液のまま使用しないこと。
- 2) 入浴直後に使用しないよう注意させること。



キャップ: PP
外装フィルム: PE

ガラス: 瓶

製造販売元

小堺製薬株式会社
東京都墨田区両国4-36-9

使用期限:
製造番号:

(調剤包装単位コード)



(01)04987371142149

(販売包装単位コード)



(01)14987371141248