

抗アレルギー点眼剤 オロパタジン点眼液0.1%「サワイ」

OLOPATADINE Ophthalmic Solution [SAWAI]

オロパタジン塩酸塩点眼液

日本標準商品分類番号

871319

貯法：遮光室温保存
使用期限：外箱等に表示

承認番号	30300AMX00397000
薬価収載	2021年12月
販売開始	2021年12月

【禁忌】(次の患者には投与しないこと)

本剤の成分に対して過敏症の既往歴のある患者

【組成・性状】

・組成

有効成分 [1mL中]	日局オロパタジン塩酸塩 1.11mg (オロパタジンとして1mg)
添加剤	塩化ナトリウム、ベンザルコニウム塩化物、無水リン酸一水素ナトリウム、pH調節剤

・製剤の性状

性状	無色～微黄色澄明 無菌水性点眼液
pH	6.5～7.5
浸透圧比 (生理食塩液に対する比)	0.9～1.1

【効能・効果】

アレルギー性結膜炎

【用法・用量】

通常、1回1～2滴、1日4回(朝、昼、夕方及び就寝前)点眼する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 本剤はベンザルコニウム塩化物を含有するため、含水性ソフトコンタクトレンズを装着したまま点眼することは避けること。〔「使用上の注意」の項参照〕
- 2) 本剤の使用により効果が認められない場合には、漫然と長期にわたり投与しないよう注意すること。

2. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

下記のような症状又は異常があらわれた場合には、投与を中止するなどの適切な処置を行うこと。

	頻度不明
眼	眼痛、角膜炎、そう痒症、眼刺激、眼瞼浮腫、眼の異常感、充血、眼瞼炎、眼脂、結膜濾胞、結膜出血、眼瞼湿疹、眼瞼紅斑、流涙増加、眼の異物感、眼部不快感、眼瞼障害、眼乾燥、眼瞼縁痂皮、霧視、眼瞼痛
精神神経系	頭痛、味覚異常、めまい
肝臓	ALT(GPT)上昇、AST(GOT)上昇
その他	ヘマトクリット減少、尿中ブドウ糖陽性、接触性皮膚炎、口内乾燥、悪心、過敏症、咽喉乾燥

3. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

- 1) 妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。〔妊娠中の投与に関する安全性は確立していない。〕
- 2) 授乳中の女性に投与することを避け、やむを得ず投与する場合には授乳を中止させること。〔動物実験(ラット、経口)で乳汁中への移行及び出生児の体重増加抑制が報告されている。〕

4. 小児等への投与

低出生体重児、新生児、乳児に対する安全性は確立していない(使用経験がない)。

5. 適用上の注意

- 1) 投与経路：点眼用のみ使用すること。
- 2) 投与时：患者に対し次の点に注意するよう指導すること。
 - (1) 点眼のとき、薬液が眼瞼皮膚等についた場合は、すぐにふき取ること。
 - (2) 薬液汚染防止のため、点眼のとき、容器の先端が直接目に触れないように注意すること。
 - (3) 本剤に含まれているベンザルコニウム塩化物は、ソフトコンタクトレンズに吸着されることがあるので、点眼時はコンタクトレンズをはずし、10分以上経過後装着すること。

【薬物動態】

生物学的同等性試験

オロパタジン点眼液0.1%「サワイ」は、標準製剤の分析結果に基づき添加剤の種類及び含量(濃度)が標準製剤と同一となるよう処方設計を行ったものであり、pH、粘度、浸透圧などの物理化学的性質が近似することから、生物学的に同等とみなされた。

【薬効薬理】

オロパタジンは、ヒスタミン_{H1}受容体拮抗作用を主体とし、ケミカルメディエーター(ロイコトリエン、トロンボキサン、PAF等)の産生・遊離抑制作用を現す。¹⁾

【有効成分に関する理化学的知見】


一般名：オロパタジン塩酸塩(Olopatadine Hydrochloride)
化学名：{11-[(1Z)-3-(Dimethylamino)propylidene]-6, 11-dihydrodibenzo[*b, e*]oxepin-2-yl} acetic acid monohydrochloride

分子式：C₂₁H₂₃NO₃・HCl

分子量：373.87

融点：約250℃(分解)

構造式：



性状：白色の結晶又は結晶性の粉末である。ギ酸に極めて溶けやすく、水にやや溶けにくく、エタノール(99.5)に極めて溶けにくい。0.01mol/L塩酸試液に溶ける。1.0gを水100mLに溶かした液のpHは2.3～3.3である。

【取扱い上の注意】

- ・安定性試験
ポリエチレン容器に充てんしたものをを用いた加速試験(40℃75%RH、6ヶ月)の結果、通常の市場流通下において3年間安定であることが推測された。²⁾

【包 装】

5 mL×10本

【主要文献及び文献請求先】

- ・主要文献
1) 第十七改正日本薬局方解説書, 廣川書店, 2016, C-1204.
2) 沢井製薬(株)社内資料[安定性試験]
- ・文献請求先 [主要文献(社内資料を含む)は下記にご請求下さい]
沢井製薬株式会社 医薬品情報センター
〒532-0003 大阪市淀川区宮原5丁目2-30
TEL: 0120-381-999 FAX: 06-6394-7355



製造販売元
沢井製薬株式会社
大阪市淀川区宮原5丁目2-30

D01 B211002