

日本標準商品分類番号	
875200	
承認番号	(61AM) 3620
薬価収載	1986.10
販売開始	1986.11

※2010年7月改訂（第6版）

2009年6月改訂（第5版、「指定医薬品」の規制区分廃止による削除）

貯 法：直射日光を避け、吸湿注意。

開封後は密栓保存。

使用期間：3年（使用期限は外箱・ラベルに表示）

漢方製剤

三 和 真武湯 エキス細粒

劇 薬

(シン ブ トウ)

EK-30

〔組成・性状〕

1. 組成

本薬1日量(4.5g)中

日局ブクリョウ …………… 5.0g

日局シャクヤク …………… 3.0g

日局ショウキョウ …………… 1.0g

日局ビャクジュツ …………… 3.0g

日局ブシ …………… 1.0g

上記の混合生薬より抽出した日局真武湯エキス2,400mgを含有する。

添加物として日局乳糖水和物、日局トウモロコシデンプン、日局結晶セルロース、日局軽質無水ケイ酸、部分アルファー化デンプンを含有する。

2. 製剤の性状

本薬は、かっ色の細粒で、特異な芳香を有し、味は苦い。

〔効能・効果〕

新陳代謝機能の衰退により、四肢や腰部が冷え、疲労倦怠感が著しく、尿量減少して、下痢し易く動悸やめまいを伴うものの次の諸症：

胃腸虚弱症、慢性胃腸カタル、慢性腎炎

〔用法・用量〕

通常、成人1日4.5gを3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。

なお、年齢、症状により適宜増減する。

〔使用上の注意〕

1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）

(1)体力の充実している患者〔副作用があらわれやすくなり、その症状が増強されるおそれがある。〕

(2)暑がり、のぼせが強く、赤ら顔の患者〔心悸亢進、のぼせ、舌のしびれ、悪心等があらわれるおそれがある。〕

2. 重要な基本的注意

(1)本剤の使用にあたっては、患者の証（体質・症状）を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。

(2)他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。ブシを含む製剤との併用には、特に注意すること。

3. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していないため、発現頻度は不明である。

	頻度不明
過敏症 ^{注1)}	発疹、発赤、掻痒、蕁麻疹等
その他	心悸亢進、のぼせ、舌のしびれ、悪心等

注1) このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。

4. 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。

5. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与しないことが望ましい。〔本剤に含まれるブシの副作用があらわれやすくなる。〕

6. 小児等への投与

小児等には慎重に投与すること。〔本剤にはブシが含まれている。〕

〔包装〕

三和真武湯エキス細粒

500g

1.5g×42包

1.5g×294包

※〔文献請求先〕

クラシエ薬品株式会社 医薬学術部

〒108-8080 東京都港区海岸3-20-20

TEL 03(5446)3352 FAX 03(5446)3371

※〔製品情報お問合せ先〕

クラシエ薬品株式会社 お客様相談センター

〒108-8080 東京都港区海岸3-20-20

TEL 03(5446)3334 FAX 03(5446)3374

〈受付時間〉10:00～17:00(土、日、祝日、弊社休業日を除く)

発 売 元 **クラシエ薬品株式会社**

東京都港区海岸3-20-20(郵便番号108-8080)

製造販売元  **三和生薬株式会社**

宇都宮市平出工業団地6番地1(郵便番号321-0905)