

# 速乾性擦り込み式手指消毒剤 ALクレミール®

\*2014年10月改訂(第6版)

日本標準商品分類番号	872619
承認番号	21000AMZ00260000
薬価収載	(薬価基準対象外)
販売開始	1998年6月

貯法:密栓し、火気を避け遮光して保存すること。

## 【禁忌(次の部位には使用しないこと)】

損傷皮膚及び粘膜[エタノールを含有するので、損傷皮膚及び粘膜への使用により、刺激作用を有する。]

## 【組成・性状】

1. 組成 100mL中 ベンザルコニウム塩化物 0.2g(0.2w/v%)及び添加物としてエタノール、その他2成分含有。

2. 性状 エタノール(日局エタノール 83vol%)を含有する無色透明の液で、特異なにおいを有する。本剤10mLには、水3mL以下と混和するが、水の量を増加するとき、白濁する。

比重 d<sub>45</sub>:0.860～0.870

## 【效能・効果】

医療施設における医師、看護師等の医療従事者の手指消毒。

## 【用法・用量】

### 1. 医療従事者の通常の手指消毒の場合

本剤約3mLを1回手掌にとり、乾燥するまで摩擦する。ただし、血清、膿汁等の有機物が付着している場合は、十分洗い落とした後、本剤による消毒を行う。

### 2. 術前・術後の術者の手指消毒の場合

手指及び前腕部を石けんでよく洗浄し、水で石けん分を十分洗い落とした後、本剤約3mLを手掌にとり、乾燥するまで摩擦し、更にこの本剤による消毒を2回繰り返す。

## 【使用上の注意】

### 1. 重要な基本的注意

(1)本剤は希釈せず、原液のまま使用すること。  
(2)本剤の使用中に誤って眼に入らないように注意すること。眼に入った場合には、直ちによく水洗すること。

\*〈調剤包装単位用コード〉



(01)04987468104227

\*〈販売包装単位用コード〉



(01)14987468104224

## 2. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

種類\頻度	頻度	不明
過敏症 <sup>注)</sup>	紅斑、そう痒感、浮腫等	
皮膚 <sup>注)</sup>	刺激症状	

注)このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

## 3. 適用上の注意

投与経路:手指消毒以外の目的には使用しないこと。

使用時:

- (1)反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。
- (2)血清・膿汁等の有機物は殺菌作用を減弱させるので、これらが付着している場合は、十分洗い落としてから使用すること。
- (3)石けん類は本剤の殺菌作用を弱めるので、予備洗浄に用了いた石けん分を十分に洗い落としてから使用すること。
- (4)引火性、爆発性があるため、火気には十分注意すること。
- (5)本剤で消毒した手指で、2.5kg以下の低出生体重児を取扱う場合、低出生体重児の皮膚がかぶれることがあるので十分注意すること。

## 【薬効・薬理】

本剤はベンザルコニウム塩化物を有効成分とするエタノール溶液であり、グラム陽性・陰性菌、MRSA、綠膿菌、真菌及び一部のウイルスに有効とされている。芽胞を形成する細菌(炭疽菌、破傷風菌等)に対する殺菌効果は期待できない。

製造販売元 サンケンコア株式会社

仙台市青葉区芋沢字大竹新田8-1

お客様相談室 TEL(022)394-3031

第4類・アルコール類・水溶性

危険等級Ⅱ



キャップ:PE  
中栓:PE  
ボトル:PE

NET.

火気厳禁

5L