ネオクレミール消毒液5%

ネオクレミール消毒液5%

＊＊2017年10月改訂（第9版）
＊2016年 6月改訂

日本標準商品分類番号	承認番号	22100AMX01807000
872619	薬価収載	2011年11月
	販売開始	1992年 7月

貯法：遮光した気密容器
注意：本剤は必ず希釈し、濃度に注意して使用して下さい。

外用殺菌消毒剤

ネオクレミール消毒液5%

クロルヘキシジングルコン酸塩5%製剤

【禁忌（次の場合には使用しないこと）】
(1) クロルヘキシジン製剤に対し過敏症の既往歴のある者
(2) 脳、脊髄、耳（内耳、中耳、外耳）
〔聴神経及び中枢神経に対して直接使用した場合は、難聴、神経障害を来すことがある。〕
＊＊(3) 膣、膀胱、口腔等の粘膜面
〔クロルヘキシジン製剤の上記部位への使用により、ショック、アナフィラキシーの症状の発現が報告されている。〕
(4) 眼

【組成・性状】

本剤はクロルヘキシジングルコン酸塩5.0w/v%を含む水溶液で非イオン性界面活性剤を含む。添加剤として赤色2号、香料を含有する。
本剤は赤色澄明な液で、芳香を有し、味は苦い。水、エタノールと混和し、4容量以下のアセトンに溶ける。振ると強く泡立つ。

【効能・効果】【用法・用量】

本剤は下記の濃度（クロルヘキシジングルコン酸塩として）に希釈し、水溶液又はエタノール溶液として使用する。

効能・効果	用法・用量	希釈倍数使用例	
手指・皮膚の消毒	0.1～0.5%水溶液	通常時	50倍希釈
		汚染時	10倍希釈
手術部位（手術野）の皮膚の消毒	0.1～0.5%水溶液	10～50倍希釈	
	0.5%エタノール溶液	10倍希釈	
皮膚の創傷部位の消毒	0.05%水溶液	100倍希釈	
医療機器の消毒	0.1～0.5%水溶液	10～50倍希釈	
	0.5%エタノール溶液	10倍希釈	
手術室・病室・家具・器具・物品等の消毒	0.05%水溶液	100倍希釈	

【使用上の注意】

1. 慎重投与（次の場合には慎重に使用すること）

(1) 薬物過敏症の既往歴のある者
(2) 喘息等のアレルギー疾患の既往歴、家族歴のある者

2. 重要な基本的注意

＊＊(1) ショック、アナフィラキシー等の反応を予測するため、使用に際してはクロルヘキシジン製剤に対する過敏症の既往歴、薬物過敏体質の有無について十分な問診を行うこと。
(2) 本剤は必ず希釈し、**濃度に注意**して使用すること。
(3) 創傷部位に使用する希釈水溶液は、調製後必ず滅菌処理すること。
(4) 産婦人科用（膣・外陰部の消毒等）、泌尿器科用（膀胱・外性器の消毒等）には使用しないこと。

3. 副作用（本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない）

＊＊(1) **重大な副作用**　ショック(0.1%未満)、**アナフィラキシー**(頻度不明)
ショック、アナフィラキシーがあらわれることがあるので観察を十分に行い、血圧低下、蕁麻疹、呼吸困難等があらわれた場合は、直ちに使用を中止し、適切な処置を行うこと。
(2) **その他の副作用**　次のような副作用が認められた場合には直ちに使用を中止し、再使用しないこと。

種類＼頻度	0.1%未満
過敏症	発疹、蕁麻疹等

4. 適用上の注意

(1) 投与経路　外用にのみ使用すること。
(2) 使用時
1) 眼に入らないように注意すること。眼に入った場合は直ちによく水洗すること。
2) 注射器、カテーテル等の神経や粘膜面に接触する可能性のある器具を本剤で消毒した場合は、滅菌水でよく洗い流した後使用すること。
3) 本剤の付着したカテーテルを透析に用いると、透析液の成分により難溶性の塩を生成することがあるので、本剤で消毒したカテーテルは、滅菌水でよく洗い流した後使用すること。
4) 本剤のアルコール溶液で術野消毒後、処置の前に乾燥させておくこと。〔電気メス等による発火事故が報告されている。〕
＊5) 溶液の状態で長時間皮膚と接触させた場合に皮膚化学熱傷を起こしたとの報告があるので、注意すること。

【薬効・薬理】

クロルヘキシジングルコン酸塩はグラム陽性菌に対しては低濃度でも迅速な効果がある。グラム陰性菌に対してはグラム陽性菌に比べて殺菌力に幅がみられるが比較的低濃度で効果がある。芽胞形成菌に対しては効力を示さない。結核菌に対しては水溶液中では抵抗性を示すが、アルコール溶液では殺菌作用を示す。

製造番号

使用期限

製造販売元
サンケミファ株式会社
仙台市青葉区芋沢字大竹新田8-1
お客様相談室　TEL(022)394-3031

折りたたんで廃棄しやすいボトルを採用

溝のある方をつぶす。

溝にそってたたむときちんとたためて空気も入りません。

つぶせるボトルなので寒冷時には、へこみ等、変形することがありますが品質には変わりなくお使いいただけます。

〈調剤包装単位用コード〉 (01)04987468105910
〈販売包装単位用コード〉 (01)14987468105917

キャップ：PP
ボトル：PE
ラベル：PP

500mL