

亜鉛華デンプン「司生堂」
(日本薬局方 亜鉛華デンプン)

薬効分類名：鎮痛, 収斂, 消炎剤

貯法：密閉容器に保存する。

2009年5月改訂(第2版)

日本標準商品分類番号	872649
承認番号	16100AMZ02278000
薬価収載	1986年3月
販売開始	1986年3月
再評価結果	1979年2月

禁忌 (次の患者には投与しないこと)

1. 重度又は広範囲の熱傷 [酸化亜鉛が創傷部位に付着し、組織修復を遷延させることがある。]
2. 患部が湿潤している場合 [酸化亜鉛が創傷部位に付着し、組織修復を遷延させることがある。]

【組成・性状】

組成 本品100 g 中、日局酸化亜鉛 50 g 含有する。
添加物としてバレイショデンプンを含有する。

性状 白色の粉末である。

【効能・効果】

下記皮膚疾患の収れん・消炎・保護・緩和な防腐
湿疹・皮膚炎、汗疹、間擦疹、日焼け

【用法・用量】

通常、症状に応じ、1日1～数回、綿などに含ませて軽く
散布して用いる。

【使用上の注意】

1. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる
調査を実施していない。

- (1) 過敏症：過敏症状（頻度不明）があらわれた場合には
使用を中止すること。
- (2) 皮膚：発疹、刺激感（頻度不明）等の症状があらわ
れることがあるので、このような場合には使用を中止
すること。

2. 適用上の注意

- (1) 投与経路：眼には使用しないこと。
- (2) 使用時：誤って吸入しないよう注意させること。

【取扱い上の注意】

<注意>

空気中から二酸化炭素を吸収して変質しやすいので注意す
ること。

製造販売 司生堂製薬株式会社
東京都新宿区下落合2-12-10