

※※2018年4月改訂（第6版）  
※2013年6月改訂

貯法等 保存条件：室温保存  
容 器：気密容器

制 酸 剤

日本薬局方

# 炭酸水素ナトリウム

日本標準商品分類番号	872344
承認番号	(61AM)第2411号
薬価収載	1986年3月
販売開始	1980年7月
再評価結果	1980年3月

※※【禁忌】（次の患者には投与しないこと）

- ※ 1. ナトリウム摂取制限を必要とする患者（高ナトリウム血症、浮腫、妊娠高血圧症候群等）〔ナトリウム貯留増加により、症状が悪化するおそれがある。〕  
2. ヘキサミンを投与中の患者（「相互作用」の項参照）

## 【組成・性状】

炭酸水素ナトリウム（NaHCO<sub>3</sub>：84.01）99.0%以上。

本品は白色の結晶又は結晶性の粉末で、においはなく、特異な塩味がある。湿った空气中で徐々に分解する。

## 【効能・効果】

経 口：

下記疾患における制酸作用と症状の改善

胃・十二指腸潰瘍、胃炎（急・慢性胃炎、薬剤性胃炎を含む）、上部消化管機能異常（神経性食思不振、いわゆる胃下垂症、胃酸過多症を含む）

アシドーシスの改善、尿酸排泄の促進と痛風発作の予防

含嗽・吸入：

上気道炎の補助療法（粘液溶解）

## 【用法・用量】

炭酸水素ナトリウムとして、通常成人1日3～5gを数回に分割経口投与する。含嗽、吸入には1回量1～2%液100mLを1日数回用いる。なお、年齢、症状により適宜増減する。

## 【使用上の注意】

### 1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）

- (1) 重篤な消化管潰瘍のある患者〔胃酸の二次的分泌（リバウンド現象）により症状が悪化するおそれがある。〕
- (2) 腎障害のある患者〔ナトリウムの貯留により症状が悪化するおそれがある。〕
- (3) 心機能障害のある患者〔ナトリウムの貯留により症状が悪化するおそれがある。〕
- (4) 肺機能障害のある患者〔症状が悪化するおそれがある。〕
- (5) 低クロル性アルカローシス等の電解質失調の患者〔症状が悪化するおそれがある。〕

### 2. 相互作用

※※ (1) 併用禁忌（併用しないこと）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ヘキサミン (ヘキサミン静注液)	本剤はヘキサミンの効果を減弱させることがある。	ヘキサミンは酸性尿中でホルムアルデヒドとなり抗菌作用を発揮するが、本剤は尿のpHを上昇させヘキサミンの効果を減弱させる。

### (2) 併用注意（併用に注意すること）

本剤は制酸作用等を有しているため、他の薬剤の吸収・排泄にも影響を与えることがある。

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
大量の牛乳、カルシウム製剤	milk-alkali syndrome(高カルシウム血症、高窒素血症、アルカローシス等)があらわれるおそれがあるので、観察を十分に行い、このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。	機序：代謝性アルカローシスが持続することにより、尿細管でのカルシウム再吸収が増加する。 危険因子：高カルシウム血症、代謝性アルカローシス、腎機能障害のある患者。

### 3. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

種類	頻度	頻度不明
代謝異常 <sup>注)</sup>		アルカローシス、ナトリウム蓄積による浮腫
消化器		胃部膨満、胃酸の二次的分泌（リバウンド現象）

注) これらの症状があらわれた場合には、減量又は投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

### 4. 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。

#### 【薬効薬理】

速効性、全身性の制酸作用を示すが、これは胃液のアルカリ化によるペプシンの失活及び発生したCO<sub>2</sub>より胃粘膜を刺激して二次的に胃液分泌を促すことによる（NaHCO<sub>3</sub>+HCl→NaCl+H<sub>2</sub>O+CO<sub>2</sub>）。また、粘液をアルカリ化することにより局所性の粘液溶解作用を示す。更に尿のpHをアルカリ性にし、尿酸の排泄を促進し、尿路結石を予防する。

#### 【有効成分に関する理化学的知見】

一般名：炭酸水素ナトリウム（Sodium Bicarbonate）

分子式：NaHCO<sub>3</sub>

分子量：84.01

性状：本品は白色の結晶又は結晶性の粉末で、においはなく、特異な塩味がある。水にやや溶けやすく、エタノール又はジエチルエーテルにほとんど溶けない。湿った空气中で徐々に分解する。

【包装】 6 6 1.6g×20 7 4 1.3g×20 2 2 2 3.9g×6

#### 【主要文献】

日本薬局方解説書 廣川書店

【文献請求先】 大阪府守口市南寺方東通1丁目4番12号

昭和製薬株式会社 医薬品製造管理係



販売

**NIPRO**

ニプロ株式会社  
大阪府守口市南寺方東通1丁目9番3号



製造販売

**昭和製薬株式会社**

大阪府守口市南寺方東通1丁目4番12号