

【使用上の注意】

1. 相互作用

併用禁忌（併用しないこと）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
水銀剤	ヨウ化水銀の毒性（腹痛、嘔吐、下痢、皮膚の炎症等）があらわれるおそれがある。	ヨウ化水銀を発生させるおそれがある。

2. 副作用 本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

(1) 重大な副作用 アナフィラキシー様症状（呼吸困難、潮紅、蕁麻疹等）（頻度不明）が他のヨウ素製剤においてあらわれることがあるとの報告があるので、このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

(2) その他の副作用

	頻度不明
過敏症 ^(注)	発疹、口腔粘膜び爛等
甲状腺	血中甲状腺ホルモン値（T ₃ 、T ₄ 等）の上昇あるいは低下などの甲状腺機能障害

注) このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

3. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

他のヨウ素製剤において、先天性甲状腺機能低下症の乳児の報告があるので妊娠中及び授乳中の婦人には、長期にわたる広範囲の使用をさけること。

貯法：気密容器

販売名：複方ヨード・グリセリン「昭和」[®]



日本標準商品分類番号 872399	口腔用剤
承認番号等（61AM）第2421号	薬価基準収載

日本薬局方 複方ヨード・グリセリン

（ルゴール液）

500mL

昭和製薬株式会社
大阪府守口市南寺方東通1-4-12

禁忌

本剤又はヨウ素に対し過敏症の既往歴のある患者

【組成・性状】

組成
100mL中 ヨウ素 1.2g
液状フェノール 0.5mL
添加物として、グリセリン、ハッカ水、ヨウ化カリウムを含有。

性状 赤褐色粘稠性の液で、特異なおいがある。
比重 d₄²⁰：約1.23

【効能・効果】

咽頭炎、喉頭炎、扁桃炎

【用法・用量】

症状に応じ、適宜適量を患部に塗布する。



製造
番号
使用
期限

