

**【禁忌】** (次の部位には使用しないこと)  
損傷皮膚及び粘膜 [刺激作用を有するので]

**【組成・性状】**

組成:イソプロパノール (C<sub>3</sub>H<sub>8</sub>O:60.10) 50vol%含有

性状:無色澄明の液で、特異なおいがある。

比重 d<sub>4</sub><sup>20</sup>: 0.918 ~ 0.931

**【効能・効果】** 手指・皮膚の消毒、医療用具の消毒。

**【用法・用量】** 通常イソプロパノールとして、50%  
液を用いる。

**【使用上の注意】**

**1. 副作用**

本剤は、副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

種類	頻度	頻度不明
過敏症 <sup>※</sup>		発疹等
皮膚 <sup>※</sup>		刺激症状

注)このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

**2. 臨床検査結果に及ぼす影響**

注射部位に発赤を起すことがあるので、アレルギーテストの判断を妨害することがある。

GS1-RSS  
01 14950498800435

JAN  
4 950498 800438

**販売名:**  
**イソプロパノール消毒液50%「昭利」**

TRADE MARK

日本標準商品分類番号 872615 外用殺菌消毒剤

承認番号 22100AMX00794000 薬価基準収載

貯法:密栓し、室温保存。火気を避けて保存。

イソプロパノール  
消毒液50%「昭利」

500mL

昭和製薬株式会社  
大阪府守口市南寺方東通1-4-12

**3. 適用上の注意**

投与経路:外用にのみ使用すること。

使用時:

- (1) 目に入らないように注意すること。入った場合には水でよく洗い流すこと。
- (2) 広範囲又は長期間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。[イソプロパノール蒸気に大量に又は繰り返しさらされた場合、粘膜への刺激、頭痛等を起すことがある。]
- (3) 同一部位に反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起すことがあるので注意すること。
- (4) 本剤は血清、膿汁等の蛋白質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している医療器具等に用いる場合には、十分に洗い落としてから使用すること。
- (5) 合成ゴム製品、合成樹脂製品、光学器具等には変質するものがあるので、このような器具は長時間浸漬しないこと。
- (6) 本剤は引火性、爆発性があるため、火気(電気メス使用等を含む)には十分注意すること。



ラベル



ボトル  
キャップ  
フィルム

飲用不可