

ロイコトリエン受容体拮抗剤
気管支喘息治療剤

日本薬局方 モンテルカストナトリウムチュアブル錠
モンテルカストチュアブル錠5mg「SN」

Montelukast






貯 法：遮光、気密容器、室温保存
(開封後は、光と湿気を避けて保存すること。)
使用期限：外装に表示
(使用期限内であっても、開封後はなるべく速やかに使用すること。)

承認番号	22900AMX00283000
薬価収載	2017年6月
販売開始	2017年6月

【禁忌(次の患者には投与しないこと)】

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

【組成・性状】

販 売 名	モンテルカストチュアブル錠5mg「SN」		
有 効 成 分 (1錠中)	モンテルカストナトリウム…5.2mg (モンテルカストとして5mg)		
添 加 物	D-マンニトール、ヒプロメロース酢酸エステル コハク酸エステル、クロスカルメロースナトリ ウム、ヒドロキシプロピルセルロース、三二酸 化鉄、香料、アスパルテーム(L-フェニルアラニ ン化合物)、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグ ネシウム		
色・剤形	うすい赤色の素錠		
外 形	表面	裏面	側面
			
規 格	直径	厚さ	重量
	9.5mm	4.5mm	300mg
識別コード	SK14		

【効能・効果】

気管支喘息

【用法・用量】

通常、6歳以上の小児にはモンテルカストとして5mgを1日1回
就寝前に経口投与する。

＜用法・用量に関連する使用上の注意＞

- 1)本剤は、口中で溶かすか、噛み砕いて服用すること。
- 2)モンテルカストチュアブル錠はモンテルカストフィルム
コーティング錠及びモンテルカスト口腔内崩壊錠と生物
学的に同等ではないため、モンテルカストチュアブル錠
5mgとモンテルカストフィルムコーティング錠5mg及び
モンテルカスト口腔内崩壊錠5mgをそれぞれ相互に代用
しないこと。

【使用上の注意】

1.重要な基本的注意

- 1)本剤は、喘息の悪化時ばかりでなく、喘息が良好にコン
トロールされている場合でも継続して服用するよう、患者、
保護者又はそれに代わり得る適切な者に十分説明してお
くこと。
- 2)本剤は気管支拡張剤、ステロイド剤等と異なり、すで
に起こっている喘息発作を緩解する薬剤ではないので、こ
のことは患者、保護者又はそれに代わり得る適切な者に
十分説明しておく必要がある。
- 3)気管支喘息患者に本剤を投与中、大発作をみた場合は、気
管支拡張剤あるいはステロイド剤を投与する必要がある。

- 4)長期ステロイド療法を受けている患者で、本剤投与によ
りステロイドの減量をはかる場合は十分な管理下で徐々
に行うこと。
- 5)本剤投与によりステロイド維持量を減量し得た患者で、本
剤の投与を中止する場合は、原疾患再発のおそれがある
ので注意すること。
- 6)モンテルカスト製剤との因果関係は明らかではないが、
うつ病、自殺念慮、自殺及び攻撃的行動を含む精神症状
が報告されているので、患者の状態を十分に観察すること。
(「7.その他の注意」の項参照)
- ※(7)モンテルカスト製剤を含めロイコトリエン拮抗剤使用時
に好酸球性多発血管炎性肉芽腫症様の血管炎を生じた
との報告がある。これらの症状は、おおむね経口ステロ
イド剤の減量・中止時に生じている。本剤使用時は、特に好
酸球数の推移及びしびれ、四肢脱力、発熱、関節痛、肺
の浸潤影等の血管炎症状に注意すること。
- 8)本剤投与により効果が認められない場合には、漫然と長
期にわたり投与しないように注意すること。

2.相互作用

本剤は、主として薬物代謝酵素チトクロームP450(CYP)2C8/2C9
及び3A4で代謝される。

併用注意(併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
フェノバルビ タール	本剤の作用が減弱す るおそれがある。	フェノバルビタール がCYP3A4を誘導し、 本剤の代謝が促進さ れる。

3.副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査
を実施していない。

(1)重大な副作用(頻度不明)

1)アナフィラキシー

アナフィラキシーがあらわれることがあるので、観察
を十分に行い、異常が認められた場合には直ちに投与
を中止し適切な処置を行うこと。

2)血管浮腫

血管浮腫があらわれることがあるので、観察を十分に
行い、異常が認められた場合には直ちに投与を中止し
適切な処置を行うこと。

3)劇症肝炎、肝炎、肝機能障害、黄疸

劇症肝炎、肝炎、肝機能障害、黄疸があらわれること
があるので、観察を十分に行い、異常が認められた場
合には投与を中止し適切な処置を行うこと。

4)中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrosis:
TEN)、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、
多形紅斑

中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群、多形紅斑
があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異
常が認められた場合には投与を中止し適切な処置を行
うこと。

5) 血小板減少

血小板減少(初期症状：紫斑、鼻出血、歯肉出血等の出血傾向)があらわれることがあるので、このような症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

(2) その他の副作用

次のような症状又は異常があらわれた場合には、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

	頻度不明
過敏症	皮疹、そう痒、蕁麻疹、肝臓の好酸球浸潤
※ 精神神経系	頭痛、傾眠、情緒不安、不眠、幻覚、めまい、感覚異常(しびれ等)、異夢、易刺激性、痙攣、激越、振戦、夢遊症、失見当識、集中力低下、記憶障害、せん妄、強迫性症状
呼吸器	肺好酸球増多症
消化器系	下痢、腹痛、胃不快感、嘔気、胸やけ、嘔吐、便秘、口内炎、消化不良
肝臓	肝機能異常、AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇、ALP上昇、 γ -GTP上昇、総ビリルビン上昇
筋骨格系	筋痙攣を含む筋痛、関節痛
その他	口渇、尿潜血、血尿、尿糖、浮腫、倦怠感、白血球数増加、尿蛋白、トリグリセリド上昇、出血傾向(鼻出血、紫斑等)、動悸、頻尿、発熱、脱毛、挫傷、脱力、疲労、遺尿

4. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

(1) 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合のみ投与すること。[妊娠中の投与に関する安全性は確立していない。海外の市販後において、妊娠中にモンテルカスト製剤を服用した患者から出生した新生児に先天性四肢奇形がみられたとの報告がある。これらの妊婦のほとんどは妊娠中、他の喘息治療薬も服用していた。モンテルカスト製剤とこれらの事象の因果関係は明らかにされていない。]

(2) 授乳中の婦人に投与する場合は慎重に投与すること。[動物実験(ラット)で乳汁中への移行が報告されている。]

5. 小児等への投与

(1) 1歳以上6歳未満の小児に対してはモンテルカスト細粒4mgを1日1回就寝前に投与すること。

(2) 1歳未満の乳児、新生児、低出生体重児に対するモンテルカスト製剤の安全性は確立していない。[国内でのモンテルカスト製剤の使用経験がない。]

6. 適用上の注意

(1) 薬剤交付時

PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。(PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔を起こして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている。)

(2) 食事の有無にかかわらず投与できる。

7. その他の注意

他社がプラセボ対照臨床試験41試験を対象に統合解析を行った結果、モンテルカスト製剤投与群9,929例中1例において自殺念慮が認められたのに対して、プラセボ群7,780例において自殺念慮は認められなかった。

また、他社がプラセボ対照臨床試験46試験を対象に統合解析を行った結果、行動変化に関連する事象(不眠、易刺激性等)が、モンテルカスト製剤投与群11,673例中319例(2.73%)、プラセボ群8,827例中200例(2.27%)において認められたが、統計学的な有意差は認められなかった。

【薬物動態】


1. 生物学的同等性試験¹⁾

(1) モンテルカストチュアブル錠5mg「SN」と標準製剤を、クロスオーバー法によりそれぞれ1錠(モンテルカストとして5mg)健康成人男子に絶食下、口中溶解後、水あり及び水なし単回経口投与して血漿中モンテルカスト濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ(AUC、Cmax)について90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、log(0.80)～log(1.25)の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された。

口中溶解後、水あり投与

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC ₀₋₂₄ (ng·hr/mL)	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	t _{1/2} (hr)
モンテルカストチュアブル錠5mg「SN」	2077.73 ± 604.43	309.63 ± 72.49	2.8 ± 0.8	4.7 ± 1.1
標準製剤(チュアブル錠、5mg)	2097.48 ± 469.83	326.54 ± 68.79	2.6 ± 0.9	4.7 ± 1.1


(Mean ± S.D., n=20)



口中溶解後、水なし投与

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC ₀₋₂₄ (ng·hr/mL)	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	t _{1/2} (hr)
モンテルカストチュアブル錠5mg「SN」	2171.45 ± 876.88	328.91 ± 108.92	3.0 ± 0.6	4.2 ± 0.9
標準製剤(チュアブル錠、5mg)	2160.72 ± 649.17	339.62 ± 70.63	2.5 ± 1.2	4.5 ± 1.1

(Mean ± S.D., n=20)




血漿中濃度並びにAUC、Cmax等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

(2)モンテルカストチチュアブル錠5mg「SN」と標準製剤を、クロスオーバー法によりそれぞれ1錠(モンテルカストとして5mg)健康成人男子に絶食下、咀嚼後、水あり及び水なし単回経口投与して血漿中モンテルカスト濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ(AUC、Cmax)について90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、 $\log(0.80) \sim \log(1.25)$ の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された。

咀嚼後、水あり投与

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC ₀₋₂₄ (ng·hr/mL)	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	t _{1/2} (hr)
モンテルカストチチュアブル錠5mg「SN」	2121.58 ± 733.63	286.23 ± 62.31	3.0 ± 1.0	5.2 ± 2.9
標準製剤 (チチュアブル錠、5mg)	2134.42 ± 598.88	308.24 ± 58.13	2.8 ± 0.8	4.3 ± 1.0


(Mean ± S.D., n=20)



咀嚼後、水なし投与

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC ₀₋₂₄ (ng·hr/mL)	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	t _{1/2} (hr)
モンテルカストチチュアブル錠5mg「SN」	2157.02 ± 689.98	323.19 ± 80.22	2.7 ± 0.8	4.2 ± 1.6
標準製剤 (チチュアブル錠、5mg)	2149.09 ± 671.26	339.86 ± 90.64	2.2 ± 0.7	4.5 ± 1.6

(Mean ± S.D., n=20)



血漿中濃度並びにAUC、Cmax等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

2. 溶出挙動²⁾

モンテルカストチチュアブル錠5mg「SN」は、日本薬局方医薬品各条に定められたモンテルカストナトリウムチチュアブル錠の溶出規格に適合していることが確認されている。


【薬効薬理³⁾】

モンテルカストナトリウムは、抗アレルギー薬である。アレルギーのメディエーターの1つであるロイコトリエン(LT)の受容体には、cysLT1受容体とcysLT2受容体があるが、本薬はcysLT1受容体遮断薬であり、気管支喘息に用いられる。

【有効成分に関する理化学的知見】

一般名：モンテルカストナトリウム (Montelukast Sodium)
 化学名：Monosodium (1-[(1*R*)-1-[3-[(1*E*)-2-(7-chloroquinolin-2-yl) ethenyl] phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl) phenyl] propyl] sulfanyl] methyl] cyclopropyl) acetate
 分子式：C₃₅H₃₅ClNNaO₃S
 分子量：608.17

構造式：



性状：白色～微黄白色の粉末である。
 メタノール及びエタノール(99.5)に極めて溶けやすく、水に溶けやすい。
 吸湿性である。
 光によって黄色に変化する。
 結晶多形が認められる。

【取扱い上の注意】

安定性試験結果⁴⁾

加速試験(40℃、相対湿度75%、6ヵ月)の結果、モンテルカストチチュアブル錠5mg「SN」は通常の市場流通下において3年間安定であることが推測された。

【包装】

モンテルカストチチュアブル錠5mg「SN」
 100錠(PTP10錠×10)
 140錠(PTP14錠×10)

【主要文献】

- シオノケミカル(株)：モンテルカストチチュアブル錠5mg「SN」の生物学的同等性に関する資料(社内資料)
- シオノケミカル(株)：モンテルカストチチュアブル錠5mg「SN」の溶出性に関する資料(社内資料)
- 第十七改正日本薬局方解説書 廣川書店
- シオノケミカル(株)：モンテルカストチチュアブル錠5mg「SN」の安定性に関する資料(社内資料)

【文献請求先】

主要文献に記載の社内資料につきましても下記にご請求下さい。
 シオノケミカル株式会社 学術情報本部
 〒104-0028 東京都中央区八重洲2丁目10番10号
 TEL：03-5202-0213
 FAX：03-5202-0230

販売元
Goshu 江州製薬株式会社
 滋賀県湖南市三雲143-1

製造販売元
SHIONO シオノケミカル株式会社
 東京都中央区八重洲2丁目10番10号