

日本標準商品分類番号
872354

貯 法：室温保存

使用期限：外箱に表示の期限内に使用すること。

承認番号	22500AMX00612000
薬価収載	2013年6月
販売開始	2013年6月*
再評価結果	1981年8月

*扶桑薬品工業(株)販売品

緩下剤

センノシド錠12mg「セイコー」

SENNOSIDE Tab.12mg "SEIKO"

【禁忌（次の患者には投与しないこと）】

- (1)本剤又はセンノシド製剤に過敏症の既往歴のある患者
- (2)急性腹症が疑われる患者、痙攣性便秘の患者〔蠕動運動亢進作用により腹痛等の症状を増悪するおそれがある。〕
- (3)重症の硬結便のある患者〔下剤の経口投与では十分な効果が得られず、腹痛等の症状を増悪するおそれがある。〕
- (4)電解質失調（特に低カリウム血症）のある患者には大量投与を避けること〔下痢が起これると電解質を喪失し、状態を悪化するおそれがある。〕

【原則禁忌（次の患者には投与しないことを原則とするが、特に必要とする場合には慎重に投与すること）】

妊婦又は妊娠している可能性のある婦人（「5.妊婦、産婦、授乳婦等への投与」の項参照）

※【組成・性状】

1. 組成

製品名	センノシド錠12mg「セイコー」
有効成分	1錠中にセンノシドA・Bをそのカルシウム塩として12mg含有する。
添加物	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスポリドン、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、白糖、炭酸Ca、アラビアゴム、ゼラチン、タルク、酸化チタン、マクロゴール、カルメロースNa、カルナウバロウ、赤色2号、黄色5号

2. 製剤の性状

剤形	色調	外形		
		表	裏	側面
糖衣錠	暗赤褐色			

識別コード	直径mm	厚みmm	重量mg
SE-SY	7.6	4.5	200

【効能・効果】

便秘症

【用法・用量】

センノシドA・B（又はそのカルシウム塩）として、通常成人1日1回12～24mg（本剤1～2錠）を就寝前に経口投与する。

高度の便秘には、1回48mg（本剤4錠）まで増量することができる。

なお、年齢、症状により適宜増減する。

※※【使用上の注意】

1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）
腹部手術後の患者〔腸管蠕動運動亢進作用により腹痛等がみられるので、消化管の手術後は特に注意すること。〕
2. 重要な基本的注意
連用による耐性の増大等のため効果が減弱し、薬剤に頼りがちになることがあるので、長期連用を避けること。
3. 副作用
本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

	頻度不明
過敏症 ^{注1)}	発疹等
代謝・栄養	低カリウム血症、低ナトリウム血症、脱水
心血管系	血圧低下
消化器	腹部不快感、大腸メラノーシス ^{注2)} 、腹痛、下痢、悪心・嘔吐、腹鳴
肝臓	ALT(GPT)上昇、AST(GOT)上昇、 γ -GTP上昇、血中ビリルビン上昇
腎臓・泌尿器	腎障害、着色尿 ^{注3)}
全身症状	疲労

注1) 投与を中止し、適切な処置を行うこと。

注2) 長期連用により発現することがある。

注3) 黄褐色又は赤色を呈することがある。



4. 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので慎重に投与すること。

5. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

(1) 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。〔妊娠中の投与に関する安全性は確立していない。〕

なお、投与した場合、子宮収縮を誘発して、流産の危険性があるので、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には大量に服用しないよう指導すること。

(2) 授乳中の婦人には授乳を避けさせることが望ましい。〔授乳中の婦人にセンノシド製剤を投与した場合、乳児に下痢がみられたとの報告がある。〕

6. 小児等への投与

低出生体重児、新生児、乳児に対する安全性は確立していない。〔使用経験がない。〕

7. 適用上の注意


薬剤交付時：PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。〔PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている。〕

【薬効薬理】

センノシドは、経口投与後、腸内菌の作用でレインアンスロンを生成し、大腸の蠕動運動を亢進させる。センノシドの作用は、通常経口投与後、8～10時間で発現する。

※※【有効成分に関する理化学的知見】

構造式：



一般名：センノシドA・Bカルシウム塩

化学名：dihydro-dirheinanthrone glucoside calcium salt

分子式：C₄₂H₃₆O₂₀Ca

分子量：900.80

性状：センノシドAとBは互いに立体異性体で、そのカルシウム塩は褐色～黒褐色の粉末で、わずかに特異なおいがあり、味はわずかに苦い。本品は水に溶けやすく、エタノール(95)及びジエチルエーテルにはほとんど溶けない。

【取扱い上の注意】

安定性試験¹⁾

包装品を用いた加速試験(40℃、75%RH、6ヵ月)の結果、センノシド錠12mg「セイコー」は通常の市場流通下において3年間安定であることが推測された。

【包装】

センノシド錠12mg「セイコー」

(バラ)	1000錠
	5000錠
(PTP)	100錠 (10錠×10)
	500錠 (10錠×50)
	1000錠 (10錠×100)

【主要文献】

1) 生晃栄養薬品株式会社 (安定性試験) 社内資料

【文献請求先】

主要文献に記載の社内資料につきましても下記にご請求下さい。

生晃栄養薬品株式会社

〒555-0025 大阪市西淀川区姫里2丁目3番28号

くすり相談室 TEL 06-6473-1623

FAX 06-6475-8080

扶桑薬品工業株式会社 研究開発センター 学術部門

〒536-8523 大阪市城東区森之宮二丁目3番30号

TEL 06-6964-2763 FAX 06-6964-2706

(9:00~17:30/土日祝日を除く)

販売元



扶桑薬品工業株式会社

大阪市城東区森之宮二丁目3番11号

製造販売元



生晃栄養薬品株式会社

大阪市西淀川区姫里2丁目3番28号