

日本標準商品分類番号	871319
承認番号	30300AMX00398
薬価収載	2021年12月
販売開始	2021年12月

貯 法：1. 室温保存
2. 外箱開封後は、遮光して保存すること。
使用期限：製造後3年(使用期限内であっても、開栓後は速やかに使用すること。)

抗アレルギー一点眼剤
オロパタジン点眼液0.1%「センジュ」
OLOPATADINE OPHTHALMIC SOLUTION 0.1%
オロパタジン塩酸塩点眼液

【禁忌(次の患者には投与しないこと)】

本剤の成分に対して過敏症の既往歴のある患者

【組成・性状】

成分・含量 (1mL中)	オロパタジン塩酸塩 1.1mg (オロパタジンとして 1mg)
添加物	無水リン酸一水素ナトリウム、塩化ナトリウム、ベンザルコニウム塩化物、塩酸、水酸化ナトリウム
剤形	水性点眼剤
色	無色～微黄色澄明
pH	6.5～7.5
浸透圧比	生理食塩液に対する比：0.9～1.1
その他	無菌製剤

【効能・効果】

アレルギー性結膜炎

【用法・用量】

通常、1回1～2滴、1日4回(朝、昼、夕方及び就寝前)点眼する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 本剤はベンザルコニウム塩化物を含有するため、含水性ソフトコンタクトレンズを装着したまま点眼することは避けること。[「適用上の注意」の項参照]
- 本剤の使用により効果が認められない場合には、漫然と長期にわたり投与しないよう注意すること。

2. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

その他の副作用

下記のような症状又は異常があらわれた場合には、投与を中止するなどの適切な処置を行うこと。

	頻度不明
眼	眼痛、角膜炎、そう痒症、眼刺激、眼瞼浮腫、眼の異常感、充血、眼瞼炎、眼脂、結膜濾胞、結膜出血、眼瞼湿疹、眼瞼紅斑、流涙増加、眼の異物感、眼部不快感、眼瞼障害、眼乾燥、眼瞼縁痂皮、霧視、眼瞼痛
精神神経系	頭痛、味覚異常、めまい

	頻度不明
肝臓	ALT(GPT)上昇、AST(GOT)上昇
その他	ヘマトクリット減少、尿中ブドウ糖陽性、接触性皮炎、口内乾燥、悪心、過敏症、咽喉乾燥

3. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

- 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。[妊娠中の投与に関する安全性は確立していない。]
- 授乳中の婦人に投与することを避け、やむを得ず投与する場合には授乳を中止させること。[動物実験(ラット、経口)で乳汁中への移行及び出生児の体重増加抑制が報告されている。]

4. 小児等への投与

低出生体重児、新生児、乳児に対する安全性は確立していない(使用経験がない)。

5. 適用上の注意

- 投与経路：点眼用により使用すること。
- 投与時：患者に対し次の点に注意するよう指導すること。
 - 点眼のとき、薬液が眼瞼皮膚等についた場合は、すぐにふき取ること。
 - 薬液汚染防止のため、点眼のとき、容器の先端が直接目に触れないように注意すること。
 - 本剤に含まれているベンザルコニウム塩化物は、ソフトコンタクトレンズに吸着されることがあるので、点眼時はコンタクトレンズをはずし、10分以上経過後装着すること¹⁾²⁾。

【薬物動態】

<生物学的同等性試験>

オロパタジン点眼液0.1%「センジュ」は、標準製剤(点眼液、0.1%)の分析結果に基づき添加剤の種類及び含量(濃度)が標準製剤と同一となるよう処方設計を行ったものであり、pH、粘度、浸透圧などの物理化学的性質が近似することから、生物学的に同等とみなされた。

【薬効薬理】

<作用機序>³⁾

ヒスタミンH₁受容体拮抗作用を主体とし、ケミカルメディエーター(ロイコトリエン、トロンボキサン、PAF等)の産生・遊離抑制作用を現す。更に、神経伝達物質タキキニン遊離抑制作用も有する。


【有効成分に関する理化学的知見】

一般名：オロパタジン塩酸塩

(Olopatadine Hydrochloride) [JAN]

化学名：{11-[(1Z)-3-(Dimethylamino)propylidene]-6,11-dihydrodibenzo[*b,e*]oxepin-2-yl}acetic acid monohydrochloride

構造式：



分子式：C₂₁H₂₃NO₃·HCl

分子量：373.87

性状：オロパタジン塩酸塩は白色の結晶又は結晶性の粉末である。

ギ酸に極めて溶けやすく、水にやや溶けにくく、エタノール(99.5)に極めて溶けにくい。

0.01 mol/L 塩酸試液に溶ける。

1.0 g を水100 mL に溶かした液のpHは2.3～3.3である。

融点：約250℃(分解)

【取扱い上の注意】

<安定性試験>⁴⁾

最終包装製品を用いた加速試験(40℃、相対湿度75%、6ヵ月)の結果、本剤は通常の市場流通下において、3年間安定であることが推測された。

【包装】

5mL×10

【主要文献】

- 1) Momose T, et al. : CLAO J, 23, 96, 1997.
- 2) Christensen MT, et al. : CLAO J, 24, 227, 1998.
- 3) 第十七改正日本薬局方解説書(廣川書店), C-1204, 2016.
- 4) 千寿製薬株式会社 社内資料

【文献請求先】

主要文献に記載の社内資料につきましても下記にご請求下さい。

〈文献請求先・製品情報お問合せ先〉

千寿製薬株式会社 カスタマーサポート室

〒541-0048 大阪市中央区瓦町三丁目1番9号

TEL 0120-069-618 FAX 06-6201-0577

受付時間 9:00～17:30(土、日、祝日を除く)

製造販売元 千寿製薬株式会社
大阪市中央区瓦町三丁目1番9号

販売 武田薬品工業株式会社
大阪市中央区道修町四丁目1番1号