



**2020年 2月改訂 (第9版, 販売名の変更)
*2019年 2月改訂

日本標準商品分類番号 871329

	28噴霧用	56噴霧用
**承認番号	30200AMX00043	30200AMX00044
**薬価収載	2020年6月	
販売開始	2006年7月	

定量噴霧式鼻過敏症治療剤

****フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液 50 μ g [CEO] 28噴霧用**

****フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液 50 μ g [CEO] 56噴霧用**

FLUTICASONE PROPIONATE NASAL SOLUTION 50 μ g

貯法: 室温保存
使用期限: 外箱等に表示

注意: 【取扱い上の注意】の項参照 フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液

【禁忌】(次の患者には投与しないこと)

- 有効な抗菌剤の存在しない感染症, 全身の真菌症の患者
[症状を増悪するおそれがある.]
- 本剤の成分に対して過敏症の既往歴のある患者

【組成・性状】

** 販売名	フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50 μ g [CEO] 28噴霧用	フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50 μ g [CEO] 56噴霧用
成分	フルチカゾンプロピオン酸エステル	
容量(1容器中)	4 mL	8 mL
含量	1容器中	2.04mg
	1回噴霧中	50 μ g
pH	5.0~7.0	
添加物	クエン酸水和物, クエン酸ナトリウム水和物, グリセリン, 結晶セルロース・カルメロースナトリウム, 香料, パラオキシ安息香酸プロピル, パラオキシ安息香酸メチル, プロピレングリコール, ベンザルコニウム塩化物	
性状	定量噴霧式の点鼻液であり, 噴霧するとき, 微細な霧状となる。内容物は白色の懸濁液で, わずかに特異なおいがある。	

【効能・効果】

アレルギー性鼻炎, 血管運動性鼻炎

【用法・用量】

成人は, 通常1回各鼻腔に1噴霧 (フルチカゾンプロピオン酸エステルとして50 μ g) を1日2回投与する。なお, 症状により適宜増減するが, 1日の最大投与量は, 8噴霧を限度とする。

<用法・用量に関連する使用上の注意>

本剤の十分な臨床効果を得るためには継続的に使用すること。

【使用上の注意】

1. 慎重投与 (次の患者には慎重に投与すること)

- 鼻咽喉感染症の患者
[症状を増悪するおそれがある.]
- 反復性鼻出血の患者
[出血を増悪するおそれがある.]

2. 重要な基本的注意

- 重症な肥厚性鼻炎や鼻茸の患者では, 本剤の鼻腔内での作用を確実にするため, これらの症状がある程度減少するよう他の療法を併用するとよい。
- 本剤の投与期間中に鼻症状の悪化がみられた場合には, 抗ヒスタミン剤あるいは, 全身性ステロイド剤を短期間併用し, 症状の軽減にあわせて併用薬剤を徐々に減量すること。

- 本剤には持続効果が認められるので, とくに**通年性の患者**において長期に使用する場合は, 症状の改善状態が持続するようであれば, 本剤の減量又は休薬につとめること。
- 季節性の疾患に対しては, その好発期を考慮し初期治療を開始し, 抗原との接触がなくなるまで続けることが望ましい。
- 全身性ステロイド剤の減量**は本剤の吸入開始後症状の安定をみて徐々に徐々に行う。減量にあたっては一般のステロイド剤の減量法に準ずる。
- 長期又は大量の全身性ステロイド療法**を受けている患者では**副腎皮質機能不全**が考えられるので, 全身性ステロイド剤の減量中並びに離脱後も**副腎皮質機能検査**を行い, 外傷, 手術, 重症感染症等の侵襲には十分に注意を払うこと。また必要があれば一時的に全身性ステロイド剤の増量を行うこと。
- 全身性ステロイド剤の減量並びに離脱**に伴って, 気管支喘息, ときに湿疹, 蕁麻疹, 眩暈, 動悸, 倦怠感, 顔のほてり, 結膜炎等の症状が発現・増悪することがある (このような症状があらわれた場合には適切な処置を行うこと)。
- 全身性ステロイド剤と比較し可能性は低いが, 点鼻ステロイド剤の投与により全身性の作用 (クッシング症候群, クッシング様症状, 副腎皮質機能抑制, 小児の成長遅延, 骨密度の低下, 白内障, 緑内障, 中心性漿液性網脈絡膜症を含む) が発現する可能性がある。特に長期間, 大量投与の場合には定期的に検査を行い, 全身性の作用が認められた場合には適切な処置を行うこと。

3. 相互作用

本剤は, 主として肝チトクロームP-450 3A4 (CYP3A4) で代謝される。

【併用注意】(併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
CYP3A4阻害作用を有する薬剤 リナビル等	副腎皮質ステロイド剤を全身投与した場合と同様の症状があらわれる可能性がある。特に, リナビルとフルチカゾンプロピオン酸エステル製剤の併用により, クッシング症候群, 副腎皮質機能抑制等が報告されているので, リナビルとの併用は治療上の有益性がこれらの症状発現の危険性を上回ると判断される場合に限ること。	CYP3A4による代謝が阻害されることにより, 本剤の血中濃度が上昇する可能性がある。リナビルは強いCYP3A4阻害作用を有し, リナビルとフルチカゾンプロピオン酸エステル製剤を併用した臨床薬理試験において, 血中フルチカゾンプロピオン酸エステル濃度の大幅な上昇, また血中コルチゾール値の著しい低下が認められている。

4. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない(再審査対象外)。

(1) 重大な副作用(頻度不明)

アナフィラキシー：アナフィラキシー(呼吸困難、全身潮紅、血管浮腫、蕁麻疹等)があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には本剤の投与を中止し、適切な処置を行うこと。

(2) その他の副作用

以下のような副作用があらわれた場合には、症状に応じて適切な処置を行うこと。

	頻度不明
過敏症 ^{注)}	発疹、浮腫
* 鼻 腔	鼻中隔穿孔、鼻潰瘍、鼻症状(刺激感、疼痛、乾燥感)、鼻出血、不快臭
口腔並びに呼吸器	咽喉頭症状(刺激感、乾燥感)、不快な味
精神神経系	振戦、睡眠障害、頭痛
* そ の 他	眼圧上昇

注)このような場合には投与を中止すること。

5. 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので、患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。

6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合のみ投与すること。

[本薬は皮下投与による動物実験(ラット、ウサギ)で副腎皮質ステロイド剤に共通した奇形発生、胎児の発育抑制がみられ、これらの所見はウサギにおいて低い用量で出現することが報告されている。]

7. 小児等への投与

小児等に対する安全性は確立していない。

8. 適用上の注意

鼻腔内噴霧用のみ使用すること。

9. その他の注意

レセルピン系製剤、 α -メチルドパ製剤等の降圧剤には、副作用として鼻閉がみられることがある。このような降圧剤服用中のアレルギー性鼻炎又は血管運動性鼻炎の患者に、本剤を投与すると、鼻閉症状に対する本剤の効果が隠蔽されるおそれがあるので、臨床的観察を十分に行いながら投与すること。

【薬効薬理】

生物学的同等性試験¹⁾

本剤はアレルギー性鼻炎実験モデルにおける薬効薬理試験により、標準製剤との生物学的同等性が確認されている。

1. 卵白アルブミン/百日せき菌液注入アレルギー性鼻炎ラットにおける血管透過性亢進の抑制

卵白アルブミン/百日せき菌液注入アレルギー性鼻炎ラットにおける鼻腔粘膜からの漏出色素量を指標とし、血管透過性抑制効果をみた試験で、本剤及び標準製剤は鼻腔粘膜からの色素の漏出量を抑制し、両剤間に有意差は認められなかった。

2. TDI鼻塗布感作モルモットにおける鼻汁分泌の抑制

TDI(Toluene 2,4-diisocyanate)を抗原とした鼻塗布感作モルモットにおいて、本剤及び標準製剤は鼻腔粘膜からの鼻汁分泌量を抑制し、両剤間に有意差は認められなかった。

【有効成分に関する理化学的知見】


一般名：フルチカゾンプロピオン酸エステル

Fluticasone Propionate [JAN]

化学名：S-Fluoromethyl 6 α ,9 α -difluoro-11 β -hydroxy-16 α -methyl-3-oxo-17 α -propionyloxyandrost-1,4-diene-17 β -carbothioate

分子式：C₂₅H₃₁F₃O₅S

化学構造式：



分子量：500.57

性 状：白色の微細な粉末である。

ジメチルスルホキシドに溶けやすく、ジクロロメタン又はアセトニトリルにやや溶けにくく、メタノール又はエタノール(99.5)に溶けにくく、水にほとんど溶けない。

【取扱い上の注意】

- 定められた用法・用量を厳重に守るよう、患者に指示すること。
- 患者には添付の携帯袋及び鼻用定量噴霧器の使用説明書を渡し、使用方法を指導すること。
- 用時振盪
- 安定性試験²⁾
最終包装製品を用いた加速試験(40℃、相対湿度75%、6カ月)の結果、本剤は通常の市場流通下において3年間安定であることが推測された。

**【包 装】

フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50 μ g「CEO」
28噴霧用：4mL×10
フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50 μ g「CEO」
56噴霧用：8mL×10

【主要文献】

- 社内資料(生物学的同等性試験)
- 社内資料(安定性試験)

【文献請求先・製品情報お問い合わせ先】

主要文献に記載の社内資料につきましては下記にご請求ください。

セオリア ファーマ株式会社 メディカルインフォメーション室
〒103-0022 東京都中央区日本橋室町三丁目3番1号
TEL 0120-72-1136
FAX 03-3243-1137

製造販売元

セオリア ファーマ 株式会社
東京都中央区日本橋室町三丁目3番1号

販売

武田薬品工業株式会社
大阪市中央区道修町四丁目1番1号