

日本標準商品分類番号 875200
承認番号 16100AMZ03859000 販売開始 1986年11月

漢方製剤

太虎堂の芎帰調血飲エキス顆粒
(キュウ キ チョウ ケツ イン)貯法：室温保存
有効期間：3年

EK-230

3. 組成・性状

3.1 組成

販売名	太虎堂の芎帰調血飲エキス顆粒			
有効成分	本品1日量 (6.0g) 中			
	日局トウキ 2.0g	日局ボタンピ 2.0g		
	日局センキュウ 2.0g	日局タイソウ 1.5g		
	日局ジオウ 2.0g	日局ショウキヨウ 1.0g		
	日局ビヤクジユツ 2.0g	日局カンゾウ 1.0g		
	日局ブクリョウ 2.0g	日局ウヤク 2.0g		
	日局チンピ 2.0g	日局ヤクモソウ 1.5g		
	日局コウブシ 2.0g			
上記の混合生薬より抽出した芎帰調血飲エキス粉末4,580mgを含有する。				
添加剤	日局乳糖水和物、日局ステアリン酸マグネシウム			

3.2 製剤の性状

剤形	顆粒
色	淡茶色～灰褐色
におい	特異なにおい
味	わずかに甘苦い
識別コード	EK-230

4. 効能又は効果

産後の神経症、体力低下、月経不順

6. 用法及び用量

通常、成人1日6.0gを3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。
なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

8. 重要な基本的注意

- 8.1 本剤の使用にあたっては、患者の証（体質・症状）を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。
- 8.2 本剤にはカンゾウが含まれているので、血清カリウム値や血圧値等に十分留意すること。[10.2、11.1.1、11.1.2 参照]
- 8.3 他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9.1 合併症・既往歴等のある患者

9.1.1 著しく胃腸の虚弱な患者

食欲不振、胃部不快感、恶心、嘔吐、下痢等があらわれるおそれがある。

9.1.2 食欲不振、恶心、嘔吐のある患者

これらの症状が悪化するおそれがある。

9.5 妊婦

妊娠又は妊娠している可能性のある女性には投与しないことが望ましい。本剤に含まれているボタンピにより流早産の危険性がある。

9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。

9.7 小児等

小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

9.8 高齢者

減量するなど注意すること。一般に生理機能が低下している。

10. 相互作用

10.2 併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
カンゾウ含有製剤 芍薬甘草湯 補中益氣湯 抑肝散 等 グリチルリチン酸及びその塩類を含有する製剤 グリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・L-システィン グリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・DL-メチオニン配合錠 等 [8.2、11.1.1、11.1.2 参照]	偽アルドステロン症があらわれやすくなる。また、低カリウム血症の結果として、ミオパシーがあらわれやすくなる。	グリチルリチン酸は尿細管でのカリウム排泄促進作用があるため、血清カリウム値の低下が促進されることが考えられる。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.1 重大な副作用

11.1.1 偽アルドステロン症（頻度不明）

低カリウム血症、血圧上昇、ナトリウム・体液の貯留、浮腫、体重増加等の偽アルドステロン症があらわれることがあるので、観察（血清カリウム値の測定等）を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。[8.2、10.2 参照]

11.1.2 ミオパシー（頻度不明）

低カリウム血症の結果としてミオパシーがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、脱力感、四肢痙攣・麻痺等の異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。[8.2、10.2 参照]

11.2 その他の副作用

	頻度不明
消化器	食欲不振、胃部不快感、恶心、嘔吐、下痢等

20. 取扱い上の注意

20.1 本剤の品質を保つため、できるだけ湿気を避け、直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。

- 20.2 開封後は特に湿気を避け、取扱いに注意すること。
20.3 本剤は生薬を原料としているので、色調等が異なることがある。

22. 包装

2.0g×42包 [分包]
2.0g×294包 [分包]
500g [ボトル]

24. 文献請求先及び問い合わせ先

〈文献請求先〉
クラシエ薬品株式会社 医薬学術統括部
〒108-8080 東京都港区海岸3-20-20
TEL 03 (5446) 3352 FAX 03 (5446) 3371

〈製品情報お問合せ先〉
クラシエ薬品株式会社 お客様相談センター
〒108-8080 東京都港区海岸3-20-20
TEL 03 (5446) 3334 FAX 03 (5446) 3374
〈受付時間〉 10:00~17:00 (土、日、祝日、弊社休業日
を除く)

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元

木虎精堂 製薬株式会社
神戸市中央区吾妻通2-1-27(郵便番号 651-0076)

26.2 発売元

クラシエ 薬品株式会社
東京都港区海岸3-20-20(郵便番号 108-8080)