

貯 法：室温保存
有効期間：3年

	20mg	40mg	80mg	160mg
承認番号	22600AMX00404	22600AMX00405	22600AMX00406	22600AMX00407
販売開始	2014年6月	2014年6月	2014年6月	2014年6月

選択的AT₁受容体ブロッカー

処方箋医薬品

(注意-医師等の処方箋により使用すること)

日本薬局方 バルサルタン錠

バルサルタン錠20mg「タカタ」

バルサルタン錠40mg「タカタ」

バルサルタン錠80mg「タカタ」

バルサルタン錠160mg「タカタ」

Valsartan Tablets "TAKATA"



2. 禁忌 (次の患者には投与しないこと)
- 2.1 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
 - 2.2 妊婦又は妊娠している可能性のある女性[9.5 参照]
 - 2.3 アリスキレンフマル酸塩を投与中の糖尿病患者(ただし、他の降圧治療を行ってもなお血圧のコントロールが著しく不良の患者を除く)[10.1 参照]

3. 組成・性状

3.1 組成

販売名	有効成分	添加剤
バルサルタン錠 20 mg 「タカタ」	1錠中 日局バルサルタン 20.0mg	低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースカルシウム、クロスポビドン、結晶セルロース、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、タルク、ヒプロメロース、マクロゴール 6000、酸化チタン、黄色三酸化鉄、カルナウバロウ
バルサルタン錠 40 mg 「タカタ」	1錠中 日局バルサルタン 40.0mg	低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースカルシウム、クロスポビドン、結晶セルロース、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、タルク、ヒプロメロース、マクロゴール 6000、酸化チタン、カルナウバロウ
バルサルタン錠 80 mg 「タカタ」	1錠中 日局バルサルタン 80.0mg	低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースカルシウム、クロスポビドン、結晶セルロース、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、タルク、ヒプロメロース、マクロゴール 6000、酸化チタン、カルナウバロウ
バルサルタン錠 160 mg 「タカタ」	1錠中 日局バルサルタン 160.0mg	低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースカルシウム、クロスポビドン、結晶セルロース、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、タルク、ヒプロメロース、マクロゴール 6000、酸化チタン、カルナウバロウ

3.2 製剤の性状

販売名	性状	外形			識別コード
		表面直径	裏面重さ	側面厚さ	
バルサルタン錠 20 mg 「タカタ」	淡黄色の入りフィルムコーティング錠	約 5.6mm	約 0.056g	約 2.4mm	TTS-030
バルサルタン錠 40 mg 「タカタ」	白色の入りフィルムコーティング錠	約 7.1mm	約 0.11g	約 2.9mm	TTS-031
バルサルタン錠 80 mg 「タカタ」	白色の入りフィルムコーティング錠	約 8.1mm	約 0.19g	約 3.8mm	TTS-032
バルサルタン錠 160 mg 「タカタ」	白色の入りフィルムコーティング錠	長径約 13.8mm, 短径約 5.6mm	約 0.37g	約 5.9mm	TTS-033

4. 効能又は効果

高血圧症

6. 用法及び用量

通常、成人にはバルサルタンとして 40~80mg を 1日 1回 経口投与する。なお、年齢、症状に応じて適宜増減するが、1日 160mg まで増量できる。

通常、6歳以上の小児には、バルサルタンとして、体重 35kg 未満の場合、20mg を、体重 35kg 以上の場合、40mg を 1日 1回 経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。ただし、1日 最高用量は、体重 35kg 未満の場合、40mg とする。

7. 用法及び用量に関連する注意

国内においては小児に対して、1日 80mg を超える使用経験がない。

8. 重要な基本的注意

- 8.1 本剤を含むアンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤投与中に肝炎等の重篤な肝障害があらわれたとの報告があるので、肝機能検査を実施するなど観察を十分に行うこと。[11.1.2 参照]
- 8.2 手術前 24 時間は投与しないことが望ましい。アンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤投与中の患者は、麻酔及び手術中にレニン-アンジオテンシン系の抑制作用による低血圧を起こす可能性がある。
- 8.3 降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9.1 合併症・既往歴等のある患者

- 9.1.1 両側性腎動脈狭窄のある患者又は片腎で腎動脈狭窄のある患者
治療上やむを得ないと判断される場合を除き、投与は避けること。腎血流量の減少や糸球体濾過圧の低下により急速に腎機能を悪化させるおそれがある。

9.1.2 高カリウム血症の患者

- 治療上やむを得ないと判断される場合を除き、投与は避けること。高カリウム血症を増悪させるおそれがある。また、腎機能障害、コントロール不良の糖尿病等により血清カリウム値が高くなりやすい患者では、血清カリウム値に注意すること。

9.1.3 脳血管障害のある患者

- 過度の降圧が脳血流不全を引き起こし、病態を悪化させるおそれがある。

9.1.4 嚴重な減塩療法中の患者

- 低用量から投与を開始し、増量する場合は徐々に行うこと。初回投与後、一過性の急激な血圧低下（失神及び意識消失等を伴う）を起こすおそれがある。[11.1.5 参照]

9.2 腎機能障害患者

9.2.1 重篤な腎機能障害（血清クレアチニン値が 3.0mg/dL 以上）のある患者

- 投与量を減らすなど慎重に投与すること。腎機能障害を悪化させるおそれがある¹⁾。[9.7.3 参照]

9.2.2 血液透析中の患者

- 低用量から投与を開始し、増量する場合は徐々に行うこと。初回投与後、一過性の急激な血圧低下（失神及び意識消失等を伴う）を起こすおそれがある。[11.1.5 参照]

9.3 肝機能障害患者

9.3.1 肝障害のある患者、特に胆汁性肝硬変及び胆汁うっ滞のある患者

- 投与量を減らすなど慎重に投与すること。本剤は主に胆汁中に排泄されるため、血中濃度が上昇するおそれがある。外国において、軽度～中等度の肝障害患者でバルサルタンの血漿中濃度が、健康成人と比較して約 2 倍に上昇することが報告されている。[16.5 参照]

* 9.4 生殖能を有する者

9.4.1 妊娠する可能性のある女性

- 妊娠していることが把握されずアンジオテンシン変換酵素阻害剤又はアンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤を使用し、胎児・新生児への影響（腎不全、頭蓋・肺・腎の形成不全、死亡等）が認められた例が報告されている^{2),3)}。

本剤の投与に先立ち、代替薬の有無等も考慮して本剤投与の必要性を慎重に検討し、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。また、投与が必要な場合には次の注意事項に留意すること。[9.5 参照]

- (1) 本剤投与開始前に妊娠していないことを確認すること。本剤投与中も、妊娠していないことを定期的に確認すること。投与中に妊娠が判明した場合には、直ちに投与を中止すること。
- (2) 次の事項について、本剤投与開始時に患者に説明すること。また、投与中も必要に応じ説明すること。
- ・妊娠中に本剤を使用した場合、胎児・新生児に影響を及ぼすリスクがあること。
 - ・妊娠が判明した又は疑われる場合は、速やかに担当医に相談すること。
 - ・妊娠を計画する場合は、担当医に相談すること。

9.4 妊婦

- 妊婦又は妊娠している可能性のある女性には投与しないこと。投与中に妊娠が判明した場合には、直ちに投与を中止すること。本剤を含むアンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤並びにアンジオテンシン変換酵素阻害剤で、妊娠中期～末期に投与された患者に胎児・新生児死亡、羊水過少症、胎児・新生児の低血圧、腎不全、高カリウム血症、頭蓋の形成不全、羊水過少症によると推測される四肢の拘縮、脳、頭蓋

顔面の奇形、肺の発育形成不全等があらわれたとの報告がある^{1),4)}。また、海外で実施されたアンジオテンシン変換酵素阻害剤におけるレトロスペクティブな疫学調査で、妊娠初期にアンジオテンシン変換酵素阻害剤を投与された患者群において、胎児奇形の相対リスクは降圧剤が投与されていない患者群に比べ高かったとの報告がある⁵⁾。[2.2、9.4.1 参照]

9.6 授乳婦

授乳しないことが望ましい。動物実験（ラットの授乳期経口投与）の 3mg/kg/日、乳汁中へ移行するとの報告がある。また、動物実験（ラットの産後期及び授乳期経口投与）の 600mg/kg/日、出生児の低体重及び生存率の低下が認められており、200mg/kg/日以上で外表分化の遅延が認められている。

9.7 小児等

- 9.7.1 低出生体重児、新生児、乳児又は 6 歳未満の幼児を対象とした臨床試験は実施していない。

- 9.7.2 糸球体濾過量（GFR）が 30mL/min/1.73m² 未満もしくは透析を受けている小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

- 9.7.3 腎機能及び血清カリウム値を注意深く観察すること。小児等の高血圧では腎機能異常を伴うことが多い。特に、腎機能に影響を及ぼす状態（発熱、脱水）の患者に本剤を投与する場合や血清カリウム値を上昇させる可能性がある他の薬剤と併用する場合は注意すること。[9.2.1、10.2 参照]

9.8 高齢者

- 9.8.1 低用量から投与を開始するなど慎重に投与すること。一般に過度の降圧は好ましくないとされている。脳梗塞等が起こるおそれがある。

- 9.8.2 高齢者の薬物動態試験で、本剤の血漿中濃度が非高齢者に比べて高くなることが認められている。[16.6.1 参照]

10. 相互作用

10.1 併用禁忌（併用しないこと）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
アリスキレンフマル酸塩 ラジレス (糖尿病患者に使用する場合。ただし、他の降圧治療を行ってもなお血圧のコントロールが著しく不良の患者を除く) [2.3 参照]	非致死性脳卒中、腎機能障害、高カリウム血症及び低血圧のリスク増加が報告されている。	レニン-アンジオテンシン系阻害作用が増強される可能性がある。

10.2 併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
アリスキレンフマル酸塩 [9.7.3 参照]	腎機能障害、高カリウム血症及び低血圧を起こすおそれがある。 なお、eGFR が 60mL/min/1.73m ² 未満の腎機能障害のある患者へのアリスキレンフマル酸塩との併用については、治療上やむを得ないと判断される場合を除き避けること。	レニン-アンジオテンシン系阻害作用が増強される可能性がある。
アンジオテンシン変換酵素阻害剤 [9.7.3 参照]	腎機能障害、高カリウム血症及び低血圧を起こすおそれがある。	レニン-アンジオテンシン系阻害作用が増強される可能性がある。

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
利尿降圧剤 フロセミド トリクロルメチ アジド等 [11.1.5 参照]	初回投与後、一過性の急激な血圧低下(失神及び意識消失等を伴う)を起こすおそれがある。低用量から本剤の投与を開始し、増量する場合は徐々に行うこと。	利尿降圧剤で治療を受けている患者にはレニン活性が亢進している患者が多く、本剤が奏効しやすい。 重度のナトリウムないし体液量の減少した患者では、まれに症候性の低血圧が生じることがある。
カリウム保持性利尿剤 スピロラク トン トリアムテレン 等 カリウム補給製剤 塩化カリウム [9.7.3 参照]	血清カリウム値が上昇することがある。	本剤のアルドステロン分泌抑制によりカリウム貯留作用が増強する可能性がある。 危険因子：腎機能障害
ドロスピレノン・エチニルエストラジオール [9.7.3 参照]	血清カリウム値が上昇することがある。	本剤による血清カリウム値の上昇とドロスピレノンの抗ミネラルコルチコイド作用によると考えられる。 危険因子：腎障害患者、血清カリウム値の高い患者
シクロスポリン [9.7.3 参照]	血清カリウム値が上昇することがある。	高カリウム血症の副作用が相互に増強されると考えられる。
トリメトプリム含有製剤 スルファメトキサゾール・トリメトプリム [9.7.3 参照]	血清カリウム値が上昇することがある。	血清カリウム値の上昇が増強されるおそれがある。
非ステロイド性消炎鎮痛剤(NSAIDs) インドメタシン 等	本剤の降圧作用が減弱することがある。	NSAIDsの腎プロスタグランジン合成阻害作用により、本剤の降圧作用が減弱することがある。
非ステロイド性消炎鎮痛剤(NSAIDs) インドメタシン 等	腎機能を悪化させるおそれがある。	NSAIDsの腎プロスタグランジン合成阻害作用により、腎血流量が低下するためと考えられる。 危険因子：高齢者
ビキサロマー	本剤の血中濃度が約30～40%に低下したとの報告がある。本剤の作用が減弱するおそれがある。	リン酸結合性ポリマーにより、同時に服用した場合、本剤の吸収を遅延あるいは減少させる可能性がある。
リチウム	リチウム中毒を起こすことが報告されている。	本剤のナトリウム排泄作用により、リチウムの蓄積が起こると考えられている。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.1 重大な副作用

11.1.1 血管浮腫（頻度不明）

顔面、口唇、咽頭、舌の腫脹等が症状としてあらわれることがある。

11.1.2 肝炎（頻度不明）

[8.1 参照]

11.1.3 腎不全（0.1%未満）

11.1.4 高カリウム血症（0.1%未満）

11.1.5 ショック（頻度不明）、失神（頻度不明）、意識消失（0.1%未満）

冷感、嘔吐、意識消失等があらわれた場合には、直ちに適切な処置を行うこと。[9.1.4、9.2.2、10.2 参照]

11.1.6 無顆粒球症（頻度不明）、白血球減少（頻度不明）、血小板減少（0.1%未満）

11.1.7 間質性肺炎（頻度不明）

発熱、咳嗽、呼吸困難、胸部X線異常等を伴う間質性肺炎があらわれることがあるので、このような場合には投与を中止し、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。

11.1.8 低血糖（頻度不明）

脱力感、空腹感、冷汗、手の震え、集中力低下、痙攣、意識障害等があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。糖尿病治療中の患者であらわれやすい。

11.1.9 横紋筋融解症（0.1%未満）

筋肉痛、脱力感、CK上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇を特徴とする横紋筋融解症があらわれることがあるので、このような場合には直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。

11.1.10 中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis：TEN）、皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群）、多形紅斑（いずれも頻度不明）

11.1.11 天疱瘡、類天疱瘡（いずれも頻度不明）

水疱、びらん等があらわれた場合には、皮膚科医と相談すること。

11.2 その他の副作用

	0.1～5%未満	0.1%未満	頻度不明
過敏症	発疹、そう痒	蕁麻疹、紅斑	光線過敏症
精神神経系	めまい、頭痛	眠気、不眠	—
血液	白血球減少、好酸球増多、貧血	—	—
循環器	低血圧、動悸	頻脈、心房細動	—
消化器	嘔気、腹痛	嘔吐、下痢、便秘、口渇、食欲不振	—
肝臓	AST、ALT、LDH、ALP、ビリルビン値の上昇	—	—
呼吸器	咳嗽	咽頭炎	—
腎臓	血中尿酸値上昇、BUN上昇、血清クレアチニン上昇	—	—
電解質	血清カリウム値上昇	低ナトリウム血症	—
その他	けん怠感、浮腫、CK上昇	胸痛、疲労感、しびれ、味覚異常、ほてり、血糖値上昇、血清コレステロール上昇、血清総蛋白減少、腰背部痛、脱力感、耳鳴	筋肉痛、関節痛、発熱

注）発現頻度は使用成績調査の結果を含む。

13. 過量投与

13.1 症状

本剤の過量投与により、著しい血圧低下が生じ、意識レベルの低下、循環虚脱に至るおそれがある。

13.2 処置

著しい低血圧の場合には、患者を仰臥位にし、速やかに生理食塩液等の静脈注射など適切な処置を行うこと。

なお、バルサルタンの血漿タンパクとの結合率は93%以上であり、血液透析によって除去できない。

14. 適用上の注意

14.1 薬剤交付時の注意

PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が

食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することがある。

16. 薬物動態

16.1 血中濃度

16.1.1 単回投与

健康成人男子にバルサルタン 20、40、80 及び 160mg (80mg×2) を単回経口投与した場合、速やかに吸収され、血漿中の未変化体は投与後 2～3 時間で最高濃度に到達した。また、Cmax 及び AUC は 160mg 投与まで投与量の増加に比例して増大し、消失半減期は 4～6 時間であった⁶⁾。

表 16-1 薬物動態学的パラメータ

投与量	Tmax (h*)	Cmax (μg/mL)	AUC (μg·h/mL)	T _{1/2} (h)
20mg	2	0.86±0.53	5.2±3.1	3.7±0.8
40mg	3	1.37±0.53	8.9±4.0	4.0±1.3
80mg	3	2.83±0.92	18.0±5.8	3.9±0.6
160mg	3	5.26±2.30	33.9±18.9	5.7±1.8

n = 6、平均±標準偏差 ※：中央値

体重が 35kg 未満又は 35kg 以上の小児患者 (7 から 14 歳の高血圧症、慢性腎臓病、もしくはネフローゼ症候群の患者) にそれぞれ 20mg 又は 40mg のバルサルタンを単回投与したときの Cmax 及び AUC は以下のとおりであった⁷⁾。

表 16-2 薬物動態パラメータ

投与量	体重 (kg*)	Cmax (μg/mL)	AUC (μg·h/mL)
20mg	20.2～31.3	2.45±0.86	12.0±3.9
40mg	38.8～61.5	2.11±0.84	11.3±6.1

n = 6、平均±標準偏差 ※：範囲 (最小値～最大値)

16.1.2 反復投与

健康成人男子にバルサルタン 160mg (80mg×2) を 1 日 1 回 7 日間反復経口投与したとき、血漿中の未変化体濃度の投与回数に伴う上昇は認められなかった。また、初回及び投与 7 日目の薬物動態パラメータはほぼ同等であり、蓄積性は認められなかった⁸⁾。

16.1.3 生物学的同等性試験

バルサルタン錠 160mg 「タカタ」とディオバン錠 160mg をクロスオーバー法により、健康成人男子 20 名にそれぞれ 1 錠 (バルサルタンとして 160mg) を空腹時に単回経口投与し、投与前、投与後 0.5、1、1.5、2、2.5、3、3.5、4、5、6、8、12、24 及び 36 時間に前腕静脈から採血した。LC/MS により測定したバルサルタンの血漿中濃度の推移及びパラメータは次のとおりであり、統計解析にて 90% 信頼区間を求めた結果、判定パラメータの対数値の平均値の差は log (0.80) ～log (1.25) の範囲にあり、両剤の生物学的同等性が確認された⁹⁾。




図 16-1 血漿中濃度

表 16-3 薬物動態パラメータ

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUCt (μg·hr/mL)	Cmax (μg/mL)	tmax (hr)	t _{1/2} (hr)
バルサルタン錠 160mg 「タカタ」	36.95±12.04	5.77±1.61	2.8±1.2	7.2±3.1
ディオバン錠 160mg	35.63±11.28	5.52±1.91	3.3±1.0	6.8±1.0

(Mean±S.D., n=20)

血漿中濃度並びに AUC、Cmax 等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

16.4 代謝

健康成人男子に¹⁴C バルサルタン 80mg を空腹時単回経口投与 8 時間後の血漿中には、主として未変化体が存在し、その他に代謝物として 4-ヒドロキシ体が認められ¹⁰⁾、*in vitro* の試験において主として CYP2C9 の関与が示唆されている¹¹⁾ (外国人のデータ)。

16.5 排泄

健康成人男子に¹⁴C バルサルタン 80mg を空腹時単回経口投与した後の排泄率は以下のとおりであった¹⁰⁾ (外国人のデータ)。

表 16-4

	糞中	尿中
総排泄率	86% (168 時間値)	13% (168 時間値)
未変化体	71% (12～72 時間値)	10% (48 時間値)
4-ヒドロキシ体	8% (12～72 時間値)	1% (48 時間値)

健康成人男子にバルサルタン 20、40、80 及び 160mg (80mg×2) を空腹時単回経口投与した際、投与後 48 時間までに投与量の 9～14% が未変化体として尿中に排泄された⁶⁾。[9.3.1 参照]

16.6 特定の背景を有する患者

16.6.1 高齢者

65 歳以上の健康成人にバルサルタン 80mg を単回経口投与したときの血漿中の未変化体濃度推移は、65 歳未満の健康成人に投与した場合に比べて Cmax が 1.2 倍、AUC が 1.7 倍高く、AUC 及び消失半減期において有意な差 (P < 0.05) が認められた¹²⁾。13) (外国人のデータ)。[9.8.2 参照]

16.8 その他

バルサルタン錠 20mg 「タカタ」、バルサルタン錠 40mg 「タカタ」、バルサルタン錠 80mg 「タカタ」はバルサルタン錠 160mg 「タカタ」と含量が異なる製剤として開発されたことから、「含量が異なる経口固形製剤の生物学的同等性試験ガイドライン」に基づき、溶出挙動を比較したところ同等と判断され、両剤は生物学的に同等とみなされた⁹⁾。

17. 臨床成績

17.1 有効性及び安全性に関する試験

17.1.1 国内臨床試験 (第Ⅱ相及び第Ⅲ相)

表 17-1

疾患名	下降 (降圧率)	
	「判定不能」を含む	「判定不能」を除く
本態性高血圧症 ^{14)～22)}	74.1% (366/494)	79.7% (366/459)
腎障害を伴う高血圧症 ²³⁾	82.8% (24/29)	82.8% (24/29)
重症高血圧症 ²⁴⁾	77.4% (24/31)	85.7% (24/28)
合計	74.7% (414/554)	80.2% (414/516)

なお、本態性高血圧症 (軽症～中等症) 患者を対象とした二重盲検比較試験で、バルサルタン錠の有効性が認められている²⁰⁾。本態性高血圧症 (軽症～中等症) 患者に、1 日 1 回 40～160mg を 12～36 週間経口投与した際、心ポンプ機能に有意な変動を認めず、末梢血管抵抗を減少させ安定した降圧作用を示した²¹⁾。本態性高血圧症 (軽症～中等症) 患者に、1 日 1 回 40～160mg を 12 週間経口投与した際、血清脂質・糖代謝に有意な変動を認めず、良好な降圧効果を示した²²⁾。

17.1.2 国内第Ⅱ相試験

本態性高血圧症 (軽症～中等症) 患者に、1 日 1 回 20～160mg を 52 週間経口投与した際、バルサルタン錠単独療法、利尿降圧薬併用療法及び Ca 拮抗薬併用療法のいずれにおいても耐薬性を認めることなく、安定した降圧作用が維持された²⁵⁾。

表 17-2

	下降 (降圧率)	
	「判定不能」を含む	「判定不能」を除く
単独療法	64.3% (45/70)	78.9% (45/57)
利尿降圧薬併用	77.3% (17/22)	77.3% (17/22)
Ca 拮抗薬併用	66.7% (8/12)	66.7% (8/12)
合計	67.3% (70/104)	76.9% (70/91)

副作用発現頻度は、単独療法で 20.0% (14/70 例)、利尿降圧薬併用療法で 18.2% (4/22 例) 及び Ca 拮抗薬併用療法で 25.0% (3/12 例) であった。主な副作用は、単独療法で動悸及び LDH 上昇がいずれも 4.3% (3/70 例)、利尿降圧薬併用療法で頭

重感、鼻水、咳、AST 上昇、ALT 上昇及び尿酸上昇がいずれも 4.5% (1/22 例)、Ca 拮抗薬併用療法で咳、夜間頻尿、ALT 上昇、BUN 上昇、血清クレアチニン上昇及び尿酸上昇がいずれも 8.3% (1/12 例) であった。

18. 薬効薬理

18.1 作用機序

バルサルタンはアンジオテンシン II 受容体のサブタイプである AT₁ 受容体を選択的に結合し、昇圧系として作用するアンジオテンシン II に対して受容体レベルでは競合的に拮抗することが明らかにされている²⁶⁾。

18.1.1 バルサルタンはラット大動脈平滑筋において、AT₁ 受容体に対するアンジオテンシン II の結合を競合的に阻害する。また、AT₁ 受容体以外の受容体に対してほとんど親和性を示さない²⁷⁾。

18.1.2 バルサルタンはウサギ摘出大動脈リング標本において、ノルアドレナリン、セロトニン及び塩化カリウムによる収縮に対しては抑制作用を示さず、アンジオテンシン II による収縮を特異的に抑制する²⁸⁾。

18.1.3 バルサルタンは経口投与により、脊髄破壊ラットにおける交感神経刺激及びノルアドレナリンによる昇圧反応の抑制作用を示さず、アンジオテンシン II による昇圧反応を特異的に抑制する²⁸⁾。

18.1.4 バルサルタンはウシ副腎球状層細胞におけるアンジオテンシン II によるアルドステロンの産生を有意に抑制する²⁶⁾、²⁸⁾。

18.1.5 バルサルタンはヒト気管支上皮細胞の ACE 活性とブラジキニン分解に影響を及ぼさない²⁹⁾。

18.2 降圧作用

18.2.1 バルサルタンは経口投与により、腎性高血圧ラット、自然発症高血圧ラット (SHR)、ナトリウム枯渇マーマーモセットの血圧を用量依存的に下降させるが、DOCA/salt 型高血圧ラットの血圧には影響を及ぼさない³⁰⁾。

18.2.2 バルサルタンは連続 (4 週) 経口投与後に休薬しても、腎性高血圧ラット、自然発症高血圧ラット (SHR) において、リバウンド現象を示さない³⁰⁾。

18.2.3 バルサルタンは長期連続 (44 週) 経口投与により、脳卒中易発症性自然発症高血圧ラット (SHR-SP) の血圧を持続的に下降させるが、心拍数の著変を示さない。また、長期連続 (48 週) 経口投与により、大動脈血管の肥厚を抑制する³⁰⁾。

18.3 血行動態並びに心臓に及ぼす作用

18.3.1 バルサルタンは経口投与により、自然発症高血圧ラット (SHR) の臓器血流量を減少させることなく、腎血流量を有意に増加する³¹⁾。

18.3.2 バルサルタンは連続 (4 週) 経口投与により虚血性心不全モデルラットの心肥大を、長期連続 (48 週) 経口投与により脳卒中易発症性自然発症高血圧ラット (SHR-SP) の心肥大を抑制する³¹⁾。

18.4 腎機能に及ぼす作用

バルサルタンは連続投与により、腎部分除去ラット (6 週) 及び脳卒中易発症性自然発症高血圧ラット (SHR-SP) (32 週、40 週、44 週) の腎障害の悪化を抑制する³²⁾。

19. 有効成分に関する理化学的知見

一般的名称：バルサルタン

(Valsartan)

化学名：(2S)-3-Methyl-2-[(N-[[2-(1H-tetrazol-5-yl) biphenyl-4-yl] methyl] pentanamido) butanoic acid


分子式：C₂₄H₂₉N₅O₃

分子量：435.52

性状：白色の粉末である。

メタノール又はエタノール (99.5) に極めて溶けやすく、水にほとんど溶けない。

化学構造式：



旋光度：[α]_D²⁰：-64～-69° (脱水及び脱溶媒物に換算したもの 0.5g、メタノール、50mL、100mm)

22. 包装

〈バルサルタン錠 20mg 「タカタ」〉

140 錠 [14 錠(PTP)×10、乾燥剤入り]

〈バルサルタン錠 40mg 「タカタ」〉

140 錠 [14 錠(PTP)×10、乾燥剤入り]

〈バルサルタン錠 80mg 「タカタ」〉

100 錠 [10 錠(PTP)×10、乾燥剤入り]

140 錠 [14 錠(PTP)×10、乾燥剤入り]

〈バルサルタン錠 160mg 「タカタ」〉

100 錠 [10 錠(PTP)×10、乾燥剤入り]

23. 主要文献

- 1) Sheps, S.G. et al. : Arch. Intern. Med. 1997 ; 157 (21) : 2413-2446
- 2) 阿部真也他：周産期医学 2017 ; 47 : 1353-1355
- 3) 齊藤大祐他：鹿児島産科婦人科学会雑誌 2021 ; 29 : 49-54
- 4) Briggs, G.G. et al. : Ann. Pharmacother. 2001 ; 35 (7-8) : 859-861
- 5) Cooper, W.O. et al. : N. Engl. J. Med. 2006 ; 354 (23) : 2443-2451
- 6) 丁 宗鉄他：臨床医薬 1998 ; 14 (10) : 1703-1725
- 7) 医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議 公知申請への該当性に係る報告書：バルサルタン (小児高血圧症)
- 8) 丁 宗鉄他：臨床医薬 1998 ; 14 (10) : 1727-1743
- 9) 沖 守他：診療と新薬 51 (3) : 271, 2014
- 10) Waldmeier, F. et al. : Xenobiotica. 1997 ; 27 (1) : 59-71
- 11) Nakashima, A. et al. : Xenobiotica. 2005 ; 35 (6) : 589-602
- 12) Sioufi, A. et al. : Biopharm. Drug Dispos. 1998 ; 19 (4) : 237-244
- 13) 高齢者での動態 (ディオバン錠) : 2000 年 9 月 22 日承認、申請資料概要へ. 3. (3)
- 14) 前期第 II 相プレパイロット試験 (ディオバン錠) : 2000 年 9 月 22 日承認、申請資料概要ト. 1. (2) .1)
- 15) 前期第 II 相パイロット試験 (ディオバン錠) : 2000 年 9 月 22 日承認、申請資料概要ト. 1. (2) .2)
- 16) 前期第 II 相血圧日内変動試験 (ディオバン錠) : 2000 年 9 月 22 日承認、申請資料概要ト. 1. (2) .3)
- 17) 後期第 II 相単独療法試験 (ディオバン錠) : 2000 年 9 月 22 日承認、申請資料概要ト. 1. (3) .1)
- 18) 後期第 II 相利尿薬併用療法試験 (ディオバン錠) : 2000 年 9 月 22 日承認、申請資料概要ト. 1. (3) .2)
- 19) 後期第 II 相 Ca 拮抗薬併用療法試験 (ディオバン錠) : 2000 年 9 月 22 日承認、申請資料概要ト. 1. (3) .2)
- 20) 第 III 相比較試験 (ディオバン錠) : 2000 年 9 月 22 日承認、申請資料概要ト. 1. (4)
- 21) 市川秀一他：臨床医薬 1998 ; 14 (10) : 1859-1878
- 22) 梶山悟朗他：臨床医薬 1998 ; 14 (10) : 1879-1900
- 23) 吉永 馨他：臨床医薬 1998 ; 14 (10) : 1923-1949
- 24) 吉永 馨他：臨床医薬 1998 ; 14 (10) : 1901-1921
- 25) 吉永 馨他：臨床医薬 2000 ; 16 (2) : 207-244
- 26) 効力を裏付ける試験 (ディオバン錠) : 2000 年 9 月 22 日承認、申請資料概要ホ. 1)
- 27) De Gasparo, M. et al. : Regul. Pept. 1995 ; 59 (3) : 303-311
- 28) Criscione, L. et al. : Br. J. Pharmacol. 1993 ; 110 (2) : 761-771
- 29) Takimoto M. et al. Eur. J. Pharmacol. 1999 ; 370 (2) : 169-177
- 30) 降圧作用 (ディオバン錠) : 2000 年 9 月 22 日承認、申請資料概要ホ. 1. (1) .1)
- 31) 血行動態並びに心臓に及ぼす影響 (ディオバン錠) : 2000 年 9 月 22 日承認、申請資料概要ホ. 1. (1) .2)
- 32) 腎機能に及ぼす影響 (ディオバン錠) : 2000 年 9 月 22 日承認、申請資料概要ホ. 1. (1) .3)

24. 文献請求先及び問い合わせ先

高田製薬株式会社 文献請求窓口

〒336-8666 さいたま市南区沼影 1 丁目 11 番 1 号

電話 0120-989-813

FAX 048-816-4183

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元

高田製薬株式会社

さいたま市西区宮前町203番地1