



\* 2020年10月改訂 (第8版) 1E  
\* 2019年4月改訂

日本標準商品分類番号 87 6132

承認番号	22500AMX01206000
薬価収載	2013年12月
販売開始	2008年11月

経口用セフェム系製剤

日本薬局方 セフジニル細粒

処方箋医薬品<sup>注)</sup>

# セフジニル細粒小児用10%「JG」

〔貯法〕

遮光保存、室温保存、気密容器

(光による退色及び湿気による固化のおそれがある)

〔使用期限〕

3年間 (外箱に表示の

期限内に使用すること。)

\* **【禁忌 (次の患者には投与しないこと)】**  
本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

\* **【原則禁忌 (次の患者には投与しないことを原則とするが、特に必要とする場合には慎重に投与すること)】**  
セフェム系抗生物質に対し過敏症の既往歴のある患者

【組成・性状】

販売名	セフジニル細粒小児用10%「JG」
成分・含量 (1g中)	日局 セフジニル 100mg (力価)
添加物	白糖、乳糖水和物、デキストリン、ヒドロキシプロピルセルロース、含水二酸化ケイ素、赤色102号、バニリン、香料、プロピレングリコール
剤形・性状	淡赤白色の細粒
識別コード	ch3Z (分包品のみ)

【効能・効果】

〈適応菌種〉

本剤に感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、モラクセラ (ブランハメラ)・カタラーリス、大腸菌、クレブシエラ属、プロテウス・ミラビリス、インフルエンザ菌

〈適応症〉

表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、膀胱炎、腎盂腎炎、中耳炎、副鼻腔炎、猩紅熱

\* **【効能・効果に関連する使用上の注意】**

咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、中耳炎、副鼻腔炎への使用にあたっては、「抗微生物薬適正使用の手引き」<sup>1)</sup>を参照し、抗菌薬投与の必要性を判断した上で、本剤の投与が適切と判断される場合に投与すること。

【用法・用量】

通常、小児に対してセフジニルとして1日量9～18mg (力価)/kgを3回に分割して経口投与する。

なお、年齢及び症状に応じて適宜増減する。

〈用法・用量に関連する使用上の注意〉

- 本剤の使用にあたっては、耐性菌の発現等を防ぐため、原則として感受性を確認し、疾病の治療上必要な最小限の期間の投与にとどめること。
- 高度の腎障害のある患者では血中濃度が持続するので、腎障害の程度に応じて投与量を減量し、投与の間隔をあけて使用すること。
- 鉄剤との併用は避けることが望ましい。  
やむを得ず併用する場合には、本剤の投与後3時間以上間隔をあけて投与する。(「3.相互作用」の項参照)

【使用上の注意】

1. 慎重投与 (次の患者には慎重に投与すること)

- ペニシリン系抗生物質に対し、過敏症の既往歴のある患者
- 本人又は両親、兄弟に気管支喘息、発疹、蕁麻疹等のアレルギー症状を起こしやすい体質を有する患者
- 高度の腎障害のある患者 (〈用法・用量に関連する使用上の注意〉の項参照)

(4) 経口摂取の不良な患者又は非経口栄養の患者、全身状態の悪い患者 [ビタミンK欠乏症状があらわれることがあるので、観察を十分に行うこと。]

2. 重要な基本的注意

ショックがあらわれるおそれがあるので、十分な問診を行うこと。

3. 相互作用

併用注意 (併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
鉄剤	本剤の吸収を約10分の1まで阻害するので、併用は避けることが望ましい。やむを得ず併用する場合には、本剤の投与後3時間以上間隔をあけて投与する。	腸管内において鉄イオンとほとんど吸収されない錯体を形成する。
ワルファリンカリウム	ワルファリンカリウムの作用が増強されるおそれがある。ただし、本剤に関する症例報告はない。	腸内細菌によるビタミンKの産生を抑制することがある。
制酸剤 (アルミニウム又はマグネシウム含有)	本剤の吸収が低下し、効果が減弱されるおそれがあるので、本剤の投与後2時間以上間隔をあけて投与する。	機序不明

4. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

(1) 重大な副作用 (頻度不明)

- ショック：ショックを起こすことがあるので、観察を十分に行い、不快感、口内異常感、喘鳴、眩暈、便秘、耳鳴、発汗等があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- アナフィラキシー：アナフィラキシー (呼吸困難、全身潮紅、血管浮腫、蕁麻疹等) があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- 皮膚障害：中毒性表皮壊死融解症 (Toxic Epidermal Necrolysis：TEN)、皮膚粘膜眼症候群 (Stevens-Johnson症候群) があらわれることがあるので、観察を十分に行い、発熱、頭痛、関節痛、皮膚や粘膜の紅斑・水疱、皮膚の緊張感・灼熱感・疼痛等が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- 血液障害：汎血球減少、無顆粒球症 (初期症状：発熱、咽頭痛、頭痛、倦怠感等)、血小板減少 (初期症状：点状出血、紫斑等)、溶血性貧血 (初期症状：発熱、ヘモグロビン尿、貧血症状等) があらわれることがあるので、定期的に検査を行うなど観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- 大腸炎：偽膜性大腸炎等の血便を伴う重篤な大腸炎があらわれることがある。腹痛、頻回の下痢があらわれた場合には直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。

- 6) 間質性肺炎、PIE症候群：発熱、咳嗽、呼吸困難、胸部X線異常、好酸球増多等を伴う間質性肺炎、PIE症候群等があらわれることがあるので、このような症状があらわれた場合には投与を中止し、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。
- 7) 腎障害：急性腎障害等の重篤な腎障害があらわれることがあるので、定期的に検査を行うなど観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- 8) 劇症肝炎、肝機能障害、黄疸：劇症肝炎等の重篤な肝炎、著しいAST (GOT)、ALT (GPT)、Al-Pの上昇等を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがあるので、定期的に検査を行うなど観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

## (2) その他の副作用

	頻度不明
過敏症 <sup>注)</sup>	発疹、蕁麻疹、紅斑、浮腫、そう痒、発熱
血液	好酸球増多、顆粒球減少
腎臓	BUN上昇
消化器	下痢、腹痛、嘔吐、悪心、食欲不振、胃部不快感、胸やけ、便秘
菌交代症	口内炎、カンジダ症、黒毛舌
ビタミン欠乏症	ビタミンK欠乏症状 (低プロトロンピン血症、出血傾向等)、ビタミンB群欠乏症状 (舌炎、口内炎、食欲不振、神経炎等)
その他	めまい、頭痛、胸部圧迫感、しびれ

注) 発現した場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。

## 5. 小児等への投与

低出生体重児、新生児に対する安全性は確立していない。(使用経験が少ない。)

## 6. 臨床検査結果に及ぼす影響

- テストテープ反応を除くベネディクト試薬、フェーリング試薬による尿糖検査では偽陽性を呈することがあるので注意すること。
- 直接クームス試験陽性を呈することがあるので注意すること。

## 7. その他の注意


- 粉ミルク、経腸栄養剤など鉄添加製品との併用により、便が赤色調を呈することがある。
- 尿が赤色調を呈することがある。

## 【薬物動態】

### 1. 生物学的同等性試験

セフジニル細粒小児用10% [JG] と標準製剤を、クロスオーバー法によりそれぞれ1g (セフジニルとして100mg (力価)) 健康成人男子に空腹時単回経口投与して血漿中セフジニル濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ (AUC、Cmax) について90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、log (0.80)~log (1.25) の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された。<sup>2)</sup>

(ng (力価)/mL)



	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC <sub>0-10</sub> (ng(力価)・hr/mL)	Cmax (ng(力価)/mL)	Tmax (hr)	t <sub>1/2</sub> (hr)
セフジニル細粒小児用10% [JG]	5263.2 ± 1369.3	1055.1 ± 294.7	3.3 ± 0.5	1.6 ± 0.3
標準製剤 (細粒剤、100mg (力価)/g)	5116.0 ± 1369.5	1003.7 ± 273.1	3 ± 0.7	1.5 ± 0.2

(Mean ± S.D., n=10)

血漿中濃度並びにAUC、Cmax等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

## 2. 溶出挙動

セフジニル細粒小児用10% [JG] は、日本薬局方医薬品各条に定められたセフジニル細粒の溶出規格に適合していることが確認されている。<sup>3)</sup>

## 【薬効薬理】

作用点は菌種により異なるが、ペニシリン結合タンパク (PBP) の1 (1a、1bs)、2及び3に親和性が高く、細菌細胞壁の合成を阻害することで抗菌作用を発揮する。グラム陽性菌及び陰性菌に広範囲な抗菌スペクトルを持ち、特にグラム陽性菌のブドウ球菌属、レンサ球菌属などに対して従来の経口用セフェム剤よりも強く、殺菌的に作用する。 $\beta$ -lactamaseに安定で、 $\beta$ -lactamase産生菌にもすぐれた抗菌力を示す。<sup>4)</sup>

## 【有効成分に関する理化学的知見】


一般名：セフジニル (Cefdinir)

化学名：(6R,7R)-7-[(Z)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-(hydroxyimino)acetylamino]-8-oxo-3-vinyl-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid

分子式：C<sub>14</sub>H<sub>13</sub>N<sub>5</sub>O<sub>5</sub>S<sub>2</sub>

分子量：395.41

構造式：



性状：セフジニルは白色～淡黄色の結晶性の粉末である。水、エタノール (95) 又はジエチルエーテルにほとんど溶けない。pH7.0の0.1mol/Lリン酸塩緩衝液に溶ける。

## 【取扱い上の注意】

### 安定性試験

最終包装製品を用いた長期保存試験 (室温保存、3年) の結果、セフジニル細粒小児用10% [JG] は通常の市場流通下において3年間安定であることが確認された。<sup>5)</sup>

## 【包装】

セフジニル細粒小児用10% [JG]

バラ：100g

分包：0.5g × 120

## 【主要文献】

- 厚生労働省健康局結核感染症課編：抗微生物薬適正使用の手引き
- 長生堂製薬株式会社 社内資料 (生物学的同等性試験に関する資料)
- 長生堂製薬株式会社 社内資料 (溶出試験に関する資料)
- 第十七改正日本薬局方解説書
- 長生堂製薬株式会社 社内資料 (安定性試験に関する資料)

## 【文献請求先】

主要文献に記載の社内資料につきましても下記にご請求下さい。  
 日本ジェネリック株式会社 お客様相談室  
 〒100-6739 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号  
 TEL 0120-893-170 FAX 0120-893-172

販売元

**JG** 日本ジェネリック株式会社  
 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

製造販売元

**Chosei** 長生堂製薬株式会社  
 徳島市国府町府中92番地