

貯法：気密容器

有効期間：ラベルに記載

承認番号 (61AM)1866

薬価収載 1955年9月

販売開始 1955年9月

再評価結果 1981年8月

去痰剤
日本薬局方 セネガシロップ
セネガシロップ「東海」
Senega Syrup

【禁忌】（次の患者には投与しないこと）

ジスルフィラム、シアナミド、カルモフル、プロカルバジン塩酸塩を投与中の患者（「相互作用」の項参照）

【組成・性状】

1. 組成

本品100mL中、セネガ4g及び添加物としてエタノール、白糖を含有する。

2. 性状

本剤は黄褐色の濃稠な液で、サリチル酸メチルような特異なにおいがあり、味は甘い。

【効能・効果】

下記疾患に伴う喀痰喀出困難

急性気管支炎、感冒・上気道炎

【用法・用量】

セネガシロップとして、通常成人1日10～35mLを3回に分割経口投与する。

なお、年齢、症状により適宜増減する。

【使用上の注意】

1. 相互作用

(1) 併用禁忌（併用しないこと）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ジスルフィラム ・ノックピン シアナミド ・シアナマイド カルモフル ・ミフロール プロカルバジン塩酸塩	これらの薬剤とのアルコール反応（顔面潮紅、血圧降下、悪心、頻脈、めまい、呼吸困難、視力低下等）を起こすおそれがある。	本剤はエタノールを含有しているため。

(2) 併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
N-メチルテトラゾールチオメチル基を有するセフェム系抗生物質 ・セフメノキシム塩酸塩 ・セフォペラゾンナトリウム ・セフペラゾンナトリウム ・セミノクスナトリウム水和物 ・セフメタゾールナトリウム ・ラタモキシセフナトリウム メトロニダゾール	これらの薬剤とのアルコール反応（顔面潮紅、悪心、頻脈、多汗、頭痛等）を起こすおそれがある。	本剤はエタノールを含有しているため。

2. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

その他の副作用

大量投与（頻度不明）

嘔気、嘔吐、下痢、食欲不振を起こすことがある。