

TRADE



MARK

2005年7月作成(第1版)

日本標準商品分類番号	8 7 2 6 1 5
承認番号	21700AMZ00393
薬価収載	2005年7月
販売開始	2005年7月

外皮用殺菌消毒剤

消工タコア

500mL

貯法：遮光した気密容器に入れ、火気を避けて保存する。

使用期限：ラベルに記載

第4類アルコール類
水溶性
危険等級Ⅱ
[火気厳禁]

販売 大成薬品工業株式会社
福岡県筑後市大字熊野字屋敷998-1
製造販売元 東海製薬株式会社
名古屋市中川区江松一丁目105

製造番号

使用期限

【禁忌】(次の部位には使用しないこと)

損傷皮膚及び粘膜〔損傷皮膚及び粘膜への使用により、刺激作用を有する。〕

【組成・性状】

1.組成

本品は、15℃でエタノール(C₂H₆O)76.9～81.4vol%を含む。
添加物として日局ユーカリ油を微量含む。

2.性状

本品は、無色澄明の液で、芳香性のおいがある。

【効能・効果】

手指・皮膚の消毒、手術部位(手術野)の皮膚の消毒、医療機器の消毒

【用法・用量】

本品をそのまま消毒部位に塗布する。

【使用上の注意】

1.重要な基本的注意

- (1) 本剤が眼に入らないように注意すること。
入った場合には直ちに水でよく洗い流すこと。
- (2) 広範囲又は長期間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。〔エタノール蒸気に大量又は繰り返しさらされた場合、粘膜への刺激、頭痛等を起こすことがある。〕

2.副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

種類/頻度	頻度不明
過敏症 ^{注)}	発疹等
皮膚 ^{注)}	刺激症状

注)このような症状があらわれた場合には
使用を中止すること。

3.適用上の注意

- (1) 投与経路：外用にのみ使用すること。
- (2) 使用時
 - 1) 同一部位に反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。
 - 2) 本剤は血清、膿汁等のたん白質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している医療器具等に用いる場合には、十分に洗い落してから使用すること。
 - 3) 合成ゴム製品、合成樹脂製品、光学器具、鏡器具、塗装カテーテル等には、変質するものがあるので、このような器具は長時間浸漬しないこと。
 - 4) 本剤は、引火性、爆発性があるため、火気に注意すること。また、電気メスを使用する場合は、乾燥させてから使用すること。

4.その他の注意

経皮的エタノール注入療法(PEIT)には使用しないこと。

【薬効薬理】

本剤は使用濃度において栄養型細菌(グラム陽性菌、グラム陰性菌)、真菌、ウイルス等には有効であるが、芽胞及び一部のウイルスに対する効果は期待できない。

(調剤用)

GS1



(販売用)

GS1



JAN



4

キャップ: PP
ボトル: PE
外装フィルム: PVC