

承認番号	23000AMX00513000
薬価収載	2019.6
販売開始	2008.4
効能追加	2005.7

EPA製剤  
日本薬局方

# イコサペント酸エチルカプセル

## イコサペント酸エチルカプセル300mg「TBP」

### Ethyl Icosapentate

貯法：室温保存


注意：開封後は、高温、湿気、光を  
避けて保存すること。

使用期限：外箱の表示を参照のこと。

#### ※※【禁忌】（次の患者には投与しないこと）

- 出血している患者（血友病、毛細血管脆弱症、消化管潰瘍、尿路出血、喀血、硝子体出血等）〔止血が困難となるおそれがある。〕
- ミフェプリストン・ミノプロストールを投与中の患者（「相互作用」の項参照）

#### 【組成・性状】

販売名	イコサペント酸エチルカプセル300mg「TBP」
成分・含量	1カプセル中 イコサペント酸エチル 300mg
添加物	トコフェロール、コハク化ゼラチン、ゼラチン、濃グリセリン、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸プロピル
色調・剤形	淡黄色透明の軟カプセルで、内容物は無色～微黄色の澄明な液体である。
外形(mm)	
識別コード	TBP 3 3 9

#### 【効能・効果】

閉塞性動脈硬化症に伴う潰瘍、疼痛および冷感の改善  
高脂血症

#### 【用法・用量】

- 閉塞性動脈硬化症に伴う潰瘍、疼痛および冷感の改善  
イコサペント酸エチルとして、通常、成人1回600mg（2カプセル）を1日3回、毎食直後に経口投与する。  
なお、年齢、症状により、適宜増減する。
- 高脂血症  
イコサペント酸エチルとして、通常、成人1回900mg（3カプセル）を1日2回又は1回600mg（2カプセル）を1日3回、食直後に経口投与する。  
ただし、トリグリセリドの異常を呈する場合には、その程度により、1回900mg（3カプセル）、1日3回まで増量できる。

#### ※※【使用上の注意】

##### 1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）

- 月経期間中の患者
- 出血傾向のある患者
- 手術を予定している患者  
〔(1)～(3)出血を助長するおそれがある。〕
- 抗凝血剤あるいは血小板凝集を抑制する薬剤を投与中の患者（「相互作用」の項参照）

##### 2. 重要な基本的注意

- 本剤を閉塞性動脈硬化症に伴う潰瘍、疼痛及び冷感の改善に用いる場合、治療にあたっては経過を十分に観察し、本剤で効果がみられない場合には、投与を中止し、他の療法に切り替えること。また、本剤投与中は定期的に血液検査を行うことが望ましい。
- 本剤を高脂血症に用いる場合には、次の点に十分留意すること。
  - 適用の前に十分な検査を実施し、高脂血症であることを確認した上で本剤の適用を考慮すること。
  - あらかじめ高脂血症治療の基本である食事療法を行い、更に運動療法や高血圧・喫煙等の虚血性心疾患のリスクファクターの軽減等も十分に考慮すること。
  - 投与中は血中脂質値を定期的に検査し、治療に対する反応が認められない場合には投与を中止すること。

##### 3. 相互作用

###### (1) 併用禁忌（併用しないこと）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ミフェプリストン・ミノプロストール メフィーゴパック	ミフェプリストン・ミノプロストールによる子宮出血の程度が悪化するおそれがある。	イコサペント酸エチルの抗血小板作用により出血が増強するおそれがある。

(2) 併用注意(併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
抗凝血剤 ワルファリン 等 血小板凝集を抑制する薬剤 アスピリン インドメタシン チクロピジン塩酸塩 シロスタゾール 等	出血傾向をきたすおそれがある。	イコサペント酸エチルは抗血小板作用を有するので、抗凝血剤、血小板凝集を抑制する薬剤との併用により相加的に出血傾向が増大すると考えられる。

4. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

(1) 重大な副作用

**肝機能障害、黄疸**(頻度不明)：AST(GOT)、ALT(GPT)、Al-P、 $\gamma$ -GTP、LDH、ビリルビン等の上昇を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。

(2) その他の副作用

以下のような副作用があらわれた場合には、症状に応じて適切な処置を行うこと。

	頻度不明
過敏症 <sup>注1)</sup>	発疹、痒痒感等
出血傾向 <sup>注2)</sup>	皮下出血、血尿、歯肉出血、眼底出血、鼻出血、消化管出血等
血液	貧血等
消化器	悪心、腹部不快感、下痢、腹痛、胸やけ、嘔吐、食欲不振、便秘、口内炎、口渇、腹部膨満感、鼓腸等
肝臓 <sup>注2)</sup>	AST(GOT)・ALT(GPT)・Al-P・ $\gamma$ -GTP・LDH・ビリルビンの上昇等の肝機能障害
腎臓	BUN・クレアチニンの上昇
呼吸器 <sup>注2)</sup>	咳嗽、呼吸困難
精神神経系	頭痛・頭重感、めまい、ふらつき、眠気、不眠、しびれ
筋骨格系	関節痛、筋肉痛、四肢痛、筋痙攣(こむら返り等)
その他	CK(CPK)の上昇、顔面潮紅、ほてり、発熱、動悸、浮腫、頻尿、尿酸上昇、全身倦怠感、血圧上昇、女性化乳房、耳鳴、発汗、痤瘡

注1) このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。

注2) 観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

5. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

(1) 妊娠中の投与に関する安全性は確立していないので、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

(2) 授乳中の婦人には投与しないことが望ましいが、やむを得ず投与する場合には授乳を避けさせること。[動物実験(ラット)で乳汁中に移行することが報告されている。]

6. 小児等への投与

低出生体重児、新生児、乳児、幼児又は小児に対する安全性は確立していない。(使用経験がない)。

7. 適用上の注意

(1) 服用時

- 1) 本剤は空腹時に投与すると吸収が悪くなるので食直後に服用させること。
- 2) 本剤は嘔まずに服用させること。

(2) 薬剤交付時

PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること(PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔を起こして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている)。


8. その他の注意

- (1) コントロール不良の高血圧症を有し、他の抗血小板剤を併用した症例において、脳出血があらわれたとの報告がある。
- (2) 本剤と同一有効成分(4g/日<sup>注1)</sup>)を含有する製剤の海外臨床試験において、心房細動又は心房粗動のリスク増加が認められたとの報告がある<sup>1)</sup>。  
注)高脂血症において本剤の承認された1日最高用量は、2,700mgである。

【薬物動態】

生物学的同等性試験<sup>2)</sup>

イコサペント酸エチルカプセル300mg「TBP」と標準製剤を、クロスオーバー法によりそれぞれ6カプセル(イコサペント酸エチルとして1800mg)を健康成人男子に、食直後単回経口投与して血漿中未変化体を測定し、得られた薬物動態パラメータ(AUC、Cmax)について統計解析を行った結果、両剤の生物学的同等性が確認された。



	AUCt ( $\mu\text{g}\cdot\text{hr}/\text{mL}$ )	Cmax ( $\mu\text{g}/\text{mL}$ )
イコサペント酸エチルカプセル300mg「TBP」	2178.6 ± 498.0	97.1 ± 24.7
標準製剤(カプセル, 300mg)	2153.2 ± 655.4	94.5 ± 29.6

(平均値 ± 標準偏差, n = 22)

血漿中濃度並びにAUC、Cmax等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

### 【有効成分に関する理化学的知見】

一般名：イコサペント酸エチル


(Ethyl Icosapentate)

化学名：Ethyl(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-5,8,11,14,17-pentaenoate

分子式：C<sub>22</sub>H<sub>34</sub>O<sub>2</sub>

分子量：330.50

化学構造式：



性状：本品は無色～微黄色の澄明な液体で、わずかに特異なおいがある。エタノール(99.5)、酢酸(100)、ヘキサンと混和し、水又はエチレングリコールにほとんど溶けない。

### 【取扱い上の注意】

#### 安定性試験<sup>3)</sup>

最終包装製品を用いた長期保存試験(25℃、相対湿度60%、3年間)の結果、外観および含量等は規格の範囲内であり、イコサペント酸エチルカプセル300mg「TBP」は通常の市場流通下において3年間安定であることが確認された。

### 【包装】

PTP 100カプセル

1000カプセル

### 【主要文献】

- 1) Bhatt, D. L. et al : N. Engl. J. Med. 380(1), 11 (2019)
- 2) 東菱薬品工業株式会社 社内資料(生物学的同等性試験)
- 3) 東菱薬品工業株式会社 社内資料(安定性試験)

### ※【文献請求先】

主要文献に記載の社内資料につきましても下記にご請求下さい。

東菱薬品工業株式会社 安全性情報課

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6丁目3番1号

TEL 03-6304-5403

FAX 03-6304-5932



販売元

**コーアイセイ株式会社**

山形市若葉町13番45号



製造販売元

**東菱薬品工業株式会社**

東京都新宿区西新宿6丁目3番1号