

70^{v/v}%イソプロパノール


400 (販売名) イソプロパノール消毒液70%「東豊」

〈外皮用殺菌消毒剤〉

ゴミ75%削減 減容ボトル

300 使用後手で簡単に折りたたみ
ゴミの減容化にお役立てください。

- ①ボトルの真ん中を両手で持ち、つぶす。
- ②しっかりと押さえ込んだ後、空気が入らないようにキャップをしめ、廃棄する。



100 製造番号：側面記載
使用期限：側面記載

容器 ボトル：PE
材質 キャップ：PP
ラベル：PE

70^{v/v}%イソプロパノール

(販売名) イソプロパノール消毒液70%「東豊」

〈外皮用殺菌消毒剤〉

2020年6月作成（第1版）

（日本標準商品分類番号 | 872615）

承認番号 30200AMX00036000
薬価収載 2020.6
販売開始 2020.8
再評価結果 1983.4

貯法：気密容器、火気を避け室温保存
使用期限：製造の翌月から3年
注意：取扱い上の注意参照

500mL



引火性

火気厳禁

危険物第4類
アルコール類
水溶性・危険等級II

【禁忌】
(次の部位には使用しないこと)
損傷皮膚及び粘膜[刺激作用を
有するので]

発売元
サラヤ株式会社
大阪市東住吉区湯里2-2-8
TEL.06-6797-2525

製造販売元
東豊薬品株式会社
〒124-0025 東京都葛飾区西新小岩4-15-3

70^{v/v}%イソプロパノール

(販売名) イソプロパノール消毒液70%「東豊」

〈外皮用殺菌消毒剤〉

【組成・性状】

組成：1mL中 イソプロパノール 700 μ L

性状：本剤は無色透明の液で、特異なにおいを有する。

【効能・効果】

手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒

【用法・用量】

通常イソプロパノールとして、50～70%液を用いる。

【使用上の注意】

1.重要な基本的注意

本剤は血清、膿汁等のたん白質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している医療器具等に用いる場合には、十分に洗い落としてから使用すること。

2.副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

その他の副作用

注) このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

3.臨床検査結果に及ぼす影響

注射部位に発赤をおこすことがあるので、アレルギー

	頻度不明
過敏症 ^{注)}	発疹等
皮膚 ^{注)}	刺激症状

製造番号

使用期限

テストの判断を妨害することがある。

4.適用上の注意

(1)人体

1) 外用にのみ使用すること。2) 眼に入らないように注意すること。入った場合には水でよく洗い流すこと。3) 広範囲又は長期間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。4) 同一部位に反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。

【取扱い上の注意】

火気厳禁 危険等級II、アルコール類、水溶性

MADE IN JAPAN

B