

抗ウイルス剤

※※ **ビダラビン軟膏3%「トowa」**

《ビダラビン軟膏》

VIDARABINE OINTMENT 3% "TOWA"

貯 法：室温保存、気密容器
 使用期限：外箱、チューブに記載

日本標準商品分類番号 87625		
承認番号	薬価収載	販売開始
22500AMX01849	2014年6月	1999年7月

【禁忌（次の患者には使用しないこと）】

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

【組成・性状】

1g中の有効成分	ビダラビン30mg
添加物	白色ワセリン、流動パラフィン
性状	白色の軟膏剤

【効能・効果】

帯状疱疹、単純疱疹

【用法・用量】

患部に適量を1日1～4回、塗布又は貼付する。

【用法・用量に関連する使用上の注意】

- 1) 本剤の使用は、発病初期に近い程効果が期待できるので、原則として発症から5日以内に使用開始すること。
- 2) 本剤を7日間使用し、改善の兆しがみられないか、あるいは悪化する場合には他の治療に切り替えること。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

本剤は局所治療を目的とした薬剤であるため、発熱、汎発疹等の全身症状がみられる場合又は使用中にあらわれた場合には重症化することがあるので、他の全身的治療を考慮すること。

2. 相互作用

併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ペントスタチン	ビダラビン（注射剤）との併用により腎不全、肝不全、神経毒性等の重篤な副作用が発現したとの報告がある。	ペントスタチンが、ビダラビンの代謝に関与するADA（アデノシンデアミナーゼ）酵素の阻害作用を有するため、ビダラビンの血中濃度が高まることによると考えられる。

3. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

以下のような副作用があらわれた場合には、症状に応じて適切な処置を行うこと。

	頻度不明
皮膚	接触皮膚炎様症状、刺激感、そう痒感等

4. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ使用すること。〔妊娠中の投与に関する安全性は確立していない。なお、静脈投与による動物実験（ラット、ウサギ）で催奇形作用が報告されている。〕

5. 小児等への投与

低出生体重児、新生児、乳児に対する安全性は確立していない。（使用経験が少ない）

6. 適用上の注意

- 1) **使用部位**：眼科用として、角膜、結膜には使用しないこと。
- 2) **その他**：本剤の基剤として使用されている油脂性成分は、コンドーム等の避妊用ラテックスゴム製品の品質を劣化・破損する可能性があるため、これらとの接触を避けさせること。

※※**【薬効薬理】**

※※**薬力学的試験**


抗ウイルス作用

単純ヘルペスウイルスⅠ型腹側部接種マウス（1群10匹）及びアシクロビル耐性ヘルペスウイルスⅡ型腹側部接種マウス（1群10匹）におけるビダラビン軟膏3%「トowa」及び標準製剤（軟膏剤、(70×2)mg/body/day×14日）の病変スコア、病変発症動物数及び生存日数を指標に比較検討した。

本剤及び標準製剤は、いずれの場合も発症抑制作用を示し生存日数を延長させ、両剤は生物学的に同等と判断された¹⁾。

【有効成分に関する理化学的知見】

構造式：



一般名：ビダラビン (Vidarabine)

化学名：9-β-D-arabinofuranosyladenine

分子式：C₁₀H₁₃N₅O₄

分子量：267.24

性 状：白色の結晶性の粉末で、におい及び味はない。ジメチルスルホキシドに溶けやすく、酢酸（100）に溶けにくく、水又はエタノール（95）に極めて溶けにくく、ジエチルエーテルにほとんど溶けない。吸湿性である。

融 点：約250℃（分解）

※※【取扱い上の注意】

※※安定性試験

最終包装製品を用いた加速試験（40℃、相対湿度75%、6ヵ月）の結果、ビダラビン軟膏3%「トーワ」は通常の市場流通下において3年間安定であることが推測された²⁾。

※※【包 装】

※※ビダラビン軟膏3%「トーワ」：2g×10、5g×10

【主要文献】

- 1) 東和薬品株式会社 社内資料：薬力学的試験
- 2) 東和薬品株式会社 社内資料：安定性試験

※【文献請求先・製品情報お問い合わせ先】

主要文献（社内資料を含む）は下記にご請求下さい。

東和薬品株式会社 学術部DIセンター（24時間受付対応）

〒571-8580 大阪府門真市新橋町2番11号

☎0120-108-932 TEL 06-6900-9108 FAX 06-6908-5797

<http://www.towayakuhin.co.jp/forstaff>



製造販売元

東和薬品株式会社

大阪府門真市新橋町2番11号