

速乾性擦り込み式手指消毒剤  
**リナパス®消毒液 0.2%**  
 Rinapass Disinfectant Solution 0.2%  
 (0.2w/v%ベンザルコニウム塩化物・エタノール溶液)

貯 法： 火気及び直射日光を避けて室温保存  
 使用期限： ラベルに表示  
 注 意： 火気厳禁 第四類アルコール類 水溶性 危険等級II

承認番号	22100AMX01235
薬価収載	薬価基準対象外
販売開始	2009年8月

**【禁忌(次の部位には使用しないこと)】**

損傷皮膚及び粘膜 [エタノールを含有するので、損傷皮膚及び粘膜への使用により、刺激作用を有する。]

**【組成・性状】**

組成	有効成分	本剤100mL中にベンザルコニウム塩化物0.2g (0.2w/v%) を含む。
	添加物	エタノール、トリスオクタン酸グリセリン、N-コキシル-L-アルギニンエチルエステルDL-ピロリドンカルボン酸塩、香料
製剤の性状		本剤はエタノールを含有する無色澄明の液で、芳香を有する。

**【効能・効果】**

医療施設における医師、看護師等の医療従事者の手指消毒

**【用法・用量】**

- 医療従事者の通常の手指消毒の場合  
本剤約3mLを1回手掌にとり、乾燥するまで摩擦する。ただし、血清、膿汁等の有機物が付着している場合は、十分に洗い落とした後、本剤による消毒を行う。
- 術前・術後の術者の手指消毒の場合  
手指及び前腕部を石けんでよく洗浄し、水で石けん分を十分洗い落とした後、本剤約3mLを手掌にとり、乾燥するまで摩擦し、更にこの本剤による消毒を2回繰り返す。

**【使用上の注意】**

**1. 重要な基本的注意**

- 本剤が眼に入らないように注意すること。眼に入った場合は直ちによく水洗すること。
- 本剤は希釈せず、原液のまま使用すること。

**2. 副作用**

本剤は副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

種類\頻度	頻度不明
過敏症	紅斑、そう痒感、浮腫 等
皮膚	刺激症状

このような症状があらわれた場合には、使用を中止すること。

**3. 適用上の注意**

**使用部位：**手指消毒以外の目的には使用しないこと。

**使用時：**

- 反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので、注意すること。
- 血清、膿汁等の有機性物質は殺菌作用を減弱させるので、これらが付着している場合は、十分に洗い落としてから使用すること。
- 石けん類は本剤の殺菌作用を減弱させるので、予備洗浄に用いた石けん分を十分に洗い落としてから使用すること。
- 引火性、爆発性があるため、火気には十分注意すること。
- 本剤で消毒した手指で、2.5kg以下の低出生体重児を取扱う場合、低出生体重児の皮膚がかぶれることがあるので十分注意すること。

**【薬効薬理】**

使用濃度において、栄養型細菌（グラム陽性菌、グラム陰性菌）、酵母菌、ウイルス等には有効であるが、芽胞（炭疽菌、破傷風菌等）及び一部のウイルスに対する効果は期待できない。

**【包装】**

500mL（ポンプ付）、500mL（ポンプなし）、5L、10L

**【文献請求先】**

中北薬品株式会社 製薬工場事業部  
 〒496-0016 愛知県津島市白浜町字番場52-1  
 TEL 0567-32-1431  
 FAX 0567-32-2961

製造販売元

 **中北薬品株式会社**  
 愛知県津島市白浜町字番場52-1