

貯 法：遮光し、室温保存。

使用期限：3年（表示の使用期限を参照すること。）

承認番号	16100AMZ01319
薬価収載	1979年1月
販売開始	1997年9月
再評価結果	1982年8月

口腔用剤

複方ヨード・グリセリン「ニッコー」

COMPOUND IODINE GLYCERIN 「NIKKO」

日本薬局方 複方ヨード・グリセリン

【禁忌】（次の患者には使用しないこと）

本剤又はヨウ素に対し過敏症の既往歴のある患者

【組成・性状】

1. 組成

本品100mL中

ヨウ素1.2g、液状フェノール0.5mL、グリセリン90mL
及び添加物としてハッカ水、ヨウ化カリウム 含有。

2. 性状

本品は赤褐色粘稠性の液で、特異なおいがある。

比重 d_{20}^{20} : 約1.23**【効能・効果】**

咽頭炎、喉頭炎、扁桃炎

【用法・用量】

症状に応じ、適宜適量を患部に塗布する。

【使用上の注意】

1. 相互作用

併用禁忌（併用しないこと）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
水銀剤	ヨウ化水銀の毒性(腹痛、嘔吐、下痢、皮膚の炎症等)があらわれるおそれがある。	ヨウ化水銀を発生させるおそれがある。

2. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

(1)重大な副作用 アナフィラキシー様症状

他のヨウ素製剤において、アナフィラキシー様症状（呼吸困難、潮紅、蕁麻疹）（0.1%未満）があらわれることがあるとの報告があるので、このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

(2)その他の副作用

	頻度不明
過敏症 注)	発疹、口腔粘膜び爛等
甲状腺	血中甲状腺ホルモン(T ₃ 、T ₄ 等)の上昇あるいは低下などの甲状腺機能異常

注) このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

3. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

他のヨウ素製剤において、先天性甲状腺機能低下症の乳児の報告があるので、妊娠中及び授乳中の婦人には長期にわたる広範囲の使用を避けること。

【包装】

500mL

【製品に関するお問い合わせ先】日興製薬販売株式会社 製品情報窓口
〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町3 2番地
TEL. 03-3254-1831

発売元

日興製薬販売株式会社

東京都千代田区神田紺屋町32番地

製造販売元

日興製薬株式会社

岐阜県羽島市江吉良町1593