

貯 法：気密容器に入れ、火気を避けて保存。
使用期限：3年（表示の使用期限を参照すること。）

承認番号	16100AMZ04466
薬価収載	1987年10月
販売開始	2010年4月
再評価結果	1983年4月

外用殺菌消毒剤

70%消毒用イソプロパノール「ニッコー」

70%ISOPROPANOL FOR DISINFECTION

【禁 忌】（次の部位には使用しないこと）
損傷皮膚及び粘膜 [刺激作用を有するので]

【組成・性状】

1. 組 成

本品は20℃でイソプロパノール (C₃H₈O) 68.0～72.0vol%を含む。

2. 性 状

本品は無色澄明の液で特異なおいがある。

比重 d_{20}^{20} ：0.872～0.883

【効能・効果】

手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒

【用法・用量】

通常イソプロパノールとして、50～70%液を用いる。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 本剤が眼に入らないように注意すること。眼に入った場合は直ちによく水洗すること。
- (2) 広範囲又は長期間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。[イソプロパノール蒸気に大量に又は繰り返しさらされた場合、粘膜への刺激、頭痛等を起こすことがある。]

2. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

	頻 度 不 明
過敏症 注)	発 疹 等
皮 膚 注)	刺 激 症 状

注) このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

3. 臨床検査結果への影響

注射部位に発赤を起こすことがあるので、アレルギーテストの判断を妨害することがある。

4. 適用上の注意

投与経路：外用にのみ使用すること。

使用時：

- (1) 同一部位（皮膚面）に反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。
- (2) 血清、膿汁等のタンパク質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している医療器具等に用いる場合には、十分に洗い落としてから使用すること。
- (3) 合成ゴム製品、合成樹脂製品、光学器具等には、変質するものがあるので、このような器具は長時間浸漬しないこと。
- (4) 引火性、爆発性があるため、**火気（電気メス使用等も含む）**には十分注意すること。

【薬効薬理】

本剤は、使用濃度において、栄養型細菌（グラム陽性菌、グラム陰性菌）等には有効であるが、芽胞（炭疽菌、破傷風菌等）及び多くのウイルスに対する効果は期待できない。

【取扱い上の注意】

安定性試験

最終包装品を用いた加速試験（40℃、75%RH、7ヶ月）の結果、通常の市場流通下において3年間安定であることが推測された。

【包 装】

500mL 10L 18L

※【製品に関するお問い合わせ先】

ヴィアトリス製薬株式会社

メディカルインフォメーション部

〒105-0001 東京都港区虎ノ門5丁目11番2号

フリーダイヤル 0120-419-043

※販売元

ヴィアトリス製薬株式会社

東京都港区虎ノ門5丁目11番2号

製造販売元

日興製薬株式会社

岐阜県羽島市江吉良町1593