

2021年7月 作成（第1版）

貯 法：室温保存

使用期限：3年（表示の使用期限を参照すること。）

日本標準商品分類番号

872649

承認番号	16100AMZ01286
薬価収載	1979年1月
販売開始	1979年1月
再評価結果	1979年2月

収斂・消炎・保護剤

酸化亜鉛「ニッコー」

ZINC OXIDE「NIKKO」

日本薬局方 酸化亜鉛

【禁忌】（次の患者には投与しないこと）

- 重度または広範囲の熱傷
[酸化亜鉛が創傷部位に付着し、組織修復を遅延させることがある。]
- 患部が湿潤している場合
[酸化亜鉛が創傷部位に付着し、組織修復を遅延させることがある。]

【組成・性状】

1. 組成

本品1g中 日局酸化亜鉛1g 含有。

2. 性状

本品は白色の無晶性の粉末で、におい及び味はない。
本品は水、エタノール(95)、酢酸(100)またはジエチルエーテルにほとんど溶けない。
本品は希塩酸または水酸化ナトリウム試液に溶ける。
本品は空気中で徐々に二酸化炭素を吸収する。

【効能・効果】

軽度の皮膚病変の収れん・消炎・保護・緩和な防腐

【用法・用量】

- 外用散剤（散布剤）として15～100%
○軟膏剤・液剤（懸濁剤・リニメント剤・ローション剤等）として2～60%
上記濃度に調製し、いずれも症状に応じ1日1～数回患部に適用する。

【使用上の注意】

1. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

	頻度不明
過敏症 ^{注)}	過敏症状
皮膚 ^{注)}	発疹、刺激感等

注) このような症状があらわれた場合には、使用を中止すること。

2. 適用上の注意

- 誤って吸入しないように注意させること。
- 眼には使用しないこと。

【製品に関するお問い合わせ先】

日興製薬販売株式会社 製品情報窓口
〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町3番地
TEL. 03-3254-1831

発売元
日興製薬販売株式会社

東京都千代田区神田紺屋町32番地

製造販売元
日興製薬株式会社

岐阜県羽島市江吉良町1593