

NIKKO

皮膚刺激剤

トウガラシチンキ 「ニッコー」

CAPSICUM TINCTURE 「NIKKO」

日本薬局方 トウガラシチンキ

500mL

2015年4月 改訂(第2版)	
2011年3月 作成	
日本標準商品分類番号	872649
承認番号	16100AMZ01308
薬価収載	1979年1月
販売開始	1979年1月
再評価結果	1982年1月

貯法：遮光し、室温保存

使用期限：3年(表示の使用期限を参照すること。)

発売元 **日興製薬販売株式会社**
東京都千代田区神田紺屋町32番地

製造販売元 **日興製薬株式会社**
岐阜県羽島市江吉良町1593

【禁忌】(次の部位には使用しないこと)
び爛・創傷皮膚及び粘膜 [刺激作用を有する]

【組成・性状】

1. 組成

本品は、総カプサイシン(カプサイシン及びジヒドロカプサイシン)0.010w/v%以上を含む。

2. 性状

本品は黄赤色の液で、味はやくように辛い。
比重 d_{20}^{20} : 約0.82

【効能・効果】

皮膚刺激剤として下記に用いる。

筋肉痛、凍瘡、凍傷(第1度)、育毛

【用法・用量】

筋肉痛、凍瘡、凍傷(第1度)には、トウガラシチンキとして、通常、10～40%を添加した液剤、軟膏剤、硬膏剤又はパップ剤を1日1～数回局所に塗布する。

育毛には、トウガラシチンキとして、通常、1～4%を添加した液剤を1日1～数回局所に塗擦する。

【使用上の注意】

1. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

	頻度不明
皮膚 ^{注)}	刺激感、疼痛

注) このような症状が強くあらわれた場合には、濃度を下げるなど適切な処置を行うこと。

2. 適用上の注意

- (1) 原液のまま使用しないこと。
- (2) 入浴直後に使用しないように注意させること。
- (3) 眼又は眼の周囲に使用しないこと。



キャップ：PP
ガラス：瓶

製造番号

使用期限

火気厳禁
第4類
アルコール類
水溶性
危険等級II