

乳酸菌製剤

日本標準商品分類番号

8 7 2 3 1 6

ビオチアスミンF-2散

BIODIASMIN F-2

貯 法：室温保存
使用期間：2年
使用期限：外箱に表示

(ラクトミン製剤)

承認番号	22000AMX02144
薬価収載	2008年12月
販売開始	1976年12月
再評価結果	1984年6月

【組成・性状】

組成

販売名	ビオチアスミンF-2散
成分・含量 (1g中)	ラクトミン1g〔1g中、乳酸菌 (<i>Streptococcus faecalis</i>) を1億～10億個〕含有
添加物	パレイシヨデンポン、トウモロコシデンポン、白糖

製剤の性状

本剤は、白色～わずかに黄褐色の粉末で、においはないか、又はわずかに特異なおいがある。

【効能・効果】

腸内菌叢の異常による諸症状の改善

【用法・用量】

通常、成人にはラクトミンとして、1日3～9gを3回に分割して経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。

【使用上の注意】

適用上の注意

調製時 アミノフィリン、イソニアジドとの配合により着色することがあるので配合を避けることが望ましい。

【薬効薬理】

- 1) *Streptococcus faecalis* 菌を投与することにより、腸内における定着、糞便の固形化及び体重の増加速度は、対照を上回ることが認められた（モルモット）¹⁾。
- 2) *Streptococcus faecalis* 菌を投与することにより、大腸菌の有害作用の消失が認められた（モルモット、ニワトリ）¹⁾。

【取扱い上の注意】

安定性試験：最終包装製品を用いた長期保存試験（25℃、相対湿度60%、36ヵ月）の結果、外観及び含量等は規格の範囲内であり、ビオチアスミンF-2散は通常の市場流通下において3年間安定であることが確認された²⁾。

※※【包装】

1kg

【主要文献】

- 1) 田波潤一郎：総合医学 17(12), 865～872, 1960
- 2) 日東薬品工業株式会社 社内資料(安定性試験資料)

※【文献請求先】

「主要文献」に記載の社内資料につきましても下記にご請求ください。

ファイザー株式会社 製品情報センター
〒151-8589 東京都渋谷区代々木3-22-7
学術情報ダイヤル 0120-664-467
FAX 03-3379-3053

【製造販売元】

日東薬品工業株式会社
京都府向日市上植野町南開35-3

【販売】

ファイザー株式会社
東京都渋谷区代々木3-22-7

【提携】

マイラン製薬株式会社
大阪市中央区本町2丁目6番8号