

貯法：気密容器で室温保存
使用期限：外箱等に表示の使用期限内に使用すること
規制区分：処方箋医薬品（注意－医師等の処方箋により使用すること）

| | |
|------|------------------|
| 承認番号 | 22000AMX01761000 |
| 薬価収載 | 2008年11月 |
| 販売開始 | 2008年11月 |

アンジオテンシン変換選択性阻害剤

日本薬局方 イミダプリル塩酸塩錠
イミダプリル塩酸塩錠10mg 「日医工」
Imidapril Hydrochloride

【禁忌（次の患者には投与しないこと）】

1. 本剤の成分に対し、過敏症の既往歴のある患者
2. 血管浮腫の既往歴のある患者（アンジオテンシン変換酵素阻害剤等の薬剤による血管浮腫、遺伝性血管浮腫、後天性血管浮腫、特発性血管浮腫等）[呼吸困難を伴う血管浮腫を発現することがある。]
3. デキストラン硫酸固定化セルロース、トリプトファン固定化ポリビニルアルコール又はポリエチレンテレフタレートを用いた吸着器によるアフレーションを施行中の患者 [ショックを起こすことがある。]（「相互作用」の項参照）
4. アクリロニトリルメタリルスルホン酸ナトリウム膜（AN69®）を用いた血液透析施行中の患者 [アナフィラキシーを発現することがある。]（「相互作用」の項参照）
5. 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人（「妊婦、産婦、授乳婦等への投与」の項参照）
6. アリスケレンフマル酸塩を投与中の糖尿病患者（ただし、他の降圧治療を行ってもなお血圧のコントロールが著しく不良の患者を除く）[非致死性脳卒中、腎機能障害、高カリウム血症及び低血圧のリスク増加が報告されている。]（「重要な基本的注意」の項参照）
- * 7. サクビトリアルバルサルタンナトリウム水和物を投与中の患者、又は投与中止から36時間以内の患者 [血管浮腫があらわれるおそれがある。]（「相互作用」の項参照）

＜用法・用量に関連する使用上の注意＞

クレアチニンクリアランスが30mL/分以下、又は血清クレアチニンが3mg/dL以上の重篤な腎機能障害のある患者では、投与量を半量にするか、若しくは投与間隔をのばすなど慎重に投与すること。[排泄の遅延による過度の血圧低下及び腎機能を悪化させるおそれがある。]（「慎重投与」の項参照）

【使用上の注意】

1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）
 - (1) 両側性腎動脈狭窄のある患者又は片腎で腎動脈狭窄のある患者（「重要な基本的注意」の項参照）
 - (2) 高カリウム血症の患者（「重要な基本的注意」の項参照）
 - (3) 腎機能障害のある患者（「用法・用量に関連する使用上の注意」及び「重大な副作用」の項参照）
 - (4) 脳血管障害のある患者 [過度の降圧が脳血流不全を惹起し、病態を悪化させることがある。]
 - (5) 高齢者（「高齢者への投与」の項参照）
2. 重要な基本的注意
 - (1) 両側性腎動脈狭窄のある患者又は片腎で腎動脈狭窄のある患者においては、腎血流量の減少や糸球体過剰の低下により急速に腎機能を悪化させるおそれがあるため、治療上やむを得ないと判断される場合を除き、使用は避けること。
 - (2) 高カリウム血症の患者においては、高カリウム血症を増悪させるおそれがあるため、治療上やむを得ないと判断される場合を除き、使用は避けること。
また、腎機能障害、コントロール不良の糖尿病等により血清カリウム値が高くなりやすい患者では、高カリウム血症が発現するおそれがあるため、血清カリウム値に注意すること。
 - (3) アリスケレンフマル酸塩を併用する場合、腎機能障害、高カリウム血症及び低血圧を起こすおそれがあるため、患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。なお、eGFRが60mL/min/1.73m²未満の腎機能障害のある患者へのアリスケレンフマル酸塩との併用については、治療上やむを得ないと判断される場合を除き避けること。
 - (4) 本剤の投与により、次の患者では、初回投与後一過性の急激な血圧低下を起こす場合があるため、投与は少量より開始し、増量する場合は患者の状態を十分に観察しながら徐々に行うこと。
 - 1) 重症の高血圧症患者
 - 2) 血液透析中の患者
 - 3) 利尿降圧剤投与中の患者（特に最近利尿降圧剤投与を開始した患者）
 - 4) 厳重な減塩療法中の患者
 - 5) 降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるため、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
 - 6) 手術前24時間は投与しないことが望ましい。

【組成・性状】

1. 組成

イミダプリル塩酸塩錠10mg「日医工」は日本薬局方イミダプリル塩酸塩錠で、1錠中イミダプリル塩酸塩10mgを含有する。

添加物としてD-マンニトール、ヒドロキシプロピルセルロース、シヨ糖脂肪酸エステル、硬化油を含有する。

2. 製剤の性状

本品は白色の割線入りの素錠である。

| 販売名 | 形状 | | | 本体コード | 包装コード |
|---------------------|---|---|---|--------|-------|
| | 重量(mg) | 直径(mm) | 厚さ(mm) | | |
| イミダプリル塩酸塩錠10mg「日医工」 |  |  |  | ㊦04210 | ㊦042 |
| | 90 | 6.5 | 2.7 | | |

【効能・効果】

高血圧症、腎実質性高血圧症

【用法・用量】

通常、成人にはイミダプリル塩酸塩として5～10mgを1日1回経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。ただし、重症高血圧症、腎障害を伴う高血圧症または腎実質性高血圧症の患者では2.5mgから投与を開始することが望ましい。

3. 相互作用

(1) 併用禁忌 (併用しないこと)

| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
|---|---|---|
| デキストラン硫酸固定化セルロース, トリプトファン固定化ポリビニルアルコール又はポリエチレンテレフタレートを用いた吸着器によるアフレーシスの施行 リポソバー® イムソバTR® セルソバ®等 | ショックを起こすことがある。 | 陰性に荷電したデキストラン硫酸固定化セルロース, トリプトファン固定化ポリビニルアルコール又はポリエチレンテレフタレートにより血中キニン系の産生が亢進し, さらに本剤によりブラジキニンの代謝が妨げられて, ブラジキニンが蓄積すると考えられる。 |
| アクリロニトリルメタリルスルホン酸ナトリウム膜を用いた透析 (AN69®) | アナフィラキシーを発現することがある。 | 多価イオン体であるAN69®により血中キニン系の産生が亢進し, さらに本剤によりブラジキニンの代謝が妨げられて, ブラジキニンが蓄積すると考えられる。 |
| * アリスキレンフマル酸塩 ラジレス (糖尿病患者に使用する場合。ただし, 他の降圧治療を行ってもなお血圧のコントロールが著しく不良の患者を除く) | 非致死性脳卒中, 腎機能障害, 高カリウム血症及び低血圧のリスク増加が報告されている。 | 併用によりレニン・アンジオテンシン系阻害作用が増強される可能性がある。 |
| * サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物 エンレスト | 血管浮腫があらわれるおそれがある。 左記薬剤を投与する場合は, 本剤を少なくとも36時間前に中止すること。 また, 左記薬剤の投与終了後に本剤を投与する場合は, 36時間以上の間隔をあけること。 | 併用により相加的にブラジキニンの分解を抑制し, 血管浮腫のリスクを増加させる可能性がある。 |

(2) 併用注意 (併用に注意すること)

| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
|--|--|---|
| カリウム保持性利尿剤 スピロノラクトン, トリアムテレン等 カリウム補給剤 塩化カリウム等 | 血清カリウム値が上昇することがある。 併用する場合は血清カリウム値に注意すること。 | 本剤はアンジオテンシンII産生を抑制し, アルドステロンの分泌を低下させるため, カリウム排泄を減少させると考えられる。 腎機能障害のある患者には特に注意する。 |

| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
|-------------------------------------|--|--|
| アリスキレンフマル酸塩 | 腎機能障害, 高カリウム血症及び低血圧を起こすおそれがあるため, 腎機能, 血清カリウム値及び血圧を十分に観察すること。 なお, eGFRが60mL/min/1.73m ² 未満の腎機能障害のある患者へのアリスキレンフマル酸塩との併用については, 治療上やむを得ないと判断される場合を除き避けること。 | 併用によりレニン・アンジオテンシン系阻害作用が増強される可能性がある。 |
| アンジオテンシンII受容体拮抗剤 | 腎機能障害, 高カリウム血症及び低血圧を起こすおそれがあるため, 腎機能, 血清カリウム値及び血圧を十分に観察すること。 | |
| 利尿降圧剤 トリクロルメチアジド, ヒドロクロロチアジド等 | 利尿降圧剤で治療中の患者に本剤を初めて投与する場合, 降圧作用が増強するおそれがあるので少量より投与するなど慎重に投与すること。 | 利尿剤の投与は血漿レニン活性を上昇させているため, 本剤の投与により急激な血圧低下を起こすと考えられる。 |
| リチウム製剤 炭酸リチウム | リチウム中毒 (眠気, 振戦, 錯乱等) を起こすことがある。 定期的にリチウムの血中濃度を測定し, 異常があれば減量もしくは投与中止する。 | 腎尿細管におけるリチウムの再吸収を促進すると考えられる。 |
| 非ステロイド性抗炎症剤 インドメタシン等 | 降圧作用が減弱することがある。 定期的に血圧を観察し, 適切な処置をとる。 | 非ステロイド性抗炎症剤のプロスタグランジン合成阻害作用により, 本剤の降圧作用を減弱させると考えられる。 |
| | 腎機能を悪化させるおそれがある。異常が認められた場合には, 投与を中止するなど適切な処置を行うこと。 | 非ステロイド性抗炎症剤のプロスタグランジン合成阻害作用により, 腎血流量が低下するためと考えられる。 |
| カリジノゲナーゼ製剤 | 本剤との併用により過度の血圧低下が引き起こされる可能性がある。 | 本剤のキニン分解抑制作用とカリジノゲナーゼ製剤のキニン産生作用により, 血管平滑筋の弛緩が増強すると考えられる。 |
| 他の降圧作用を有する薬剤 降圧剤, 硝酸剤等 | 降圧作用が増強することがある。 定期的に血圧を測定し, 両剤の用量を調節する。 | 相加的に作用 (降圧作用) を増強させると考えられる。 |

4. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

(1) 重大な副作用 (頻度不明)

1) 血管浮腫

呼吸困難を伴う顔面, 舌, 声門, 喉頭の腫脹を症状とする血管浮腫があらわれることがあるので, 異常が認められた場合には直ちに投与を中止し, 抗ヒスタミン剤, 副腎皮質ホルモン剤の投与及び気道確保等の適切な処置を

行うこと。

2) 血小板減少

重篤な血小板減少があらわれることがあるので、このような場合には直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。

3) 急性腎障害、腎機能障害の増悪

急性腎障害、腎機能障害の増悪があらわれることがあるので、腎機能検査を行うなど観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

4) 高カリウム血症

重篤な高カリウム血症があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、直ちに適切な処置を行うこと。

5) 紅皮症（剥脱性皮膚炎）、皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群）、天疱瘡様症状

紅皮症（剥脱性皮膚炎）、皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群）、天疱瘡様症状があらわれることがあるので、紅斑、水疱、そう痒、発熱、粘膜疹等があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

(2) 重大な副作用（類薬）

1) 汎血球減少

他のアンジオテンシン変換酵素阻害剤で、汎血球減少があらわれたとの報告があるので、このような異常が認められた場合には直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。

2) 膵炎

他のアンジオテンシン変換酵素阻害剤で、膵炎があらわれたとの報告があるので、血中のアミラーゼ、リパーゼの上昇等が認められた場合には、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

(3) その他の副作用

副作用が認められた場合には、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

| | 頻度不明 |
|-------|---|
| 血液 | 赤血球減少、ヘモグロビン減少、ヘマトクリット減少、血小板減少、白血球減少、好酸球増多 |
| 腎臓 | 血清クレアチニン上昇、BUN上昇、蛋白尿 |
| 精神神経系 | 頭痛、ふらつき、めまい、立ちくらみ、不眠、眠気 |
| 循環器 | 低血圧、動悸 |
| 呼吸器 | 咳、咽頭部異和感・不快感、痰、嗝声 |
| 消化器 | 悪心、嘔気、嘔吐、胃部不快感、腹痛、食欲不振、下痢 |
| 肝臓 | AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇、Al-P上昇、LDH上昇、黄疸、γ-GTP上昇 |
| 過敏症 | 発疹、そう痒、光線過敏症、蕁麻疹 |
| その他 | 血清カリウム上昇、耳鳴、味覚異常、口渇、CK(CPK)上昇、胸部不快感、疲労、倦怠感、浮腫、顔面潮紅、脱毛、しびれ、脱力感、低血糖 |

5. 高齢者への投与

低用量（例えば2.5mg）から投与を開始するなど、患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。

- 本剤は主として腎臓から排泄されるが、一般に高齢者では腎機能が低下していることが多いため高い血中濃度が持続するおそれがあり、副作用が発現又は作用が増強しやすい。
- 高齢者では一般に過度の降圧は好ましくないとされている（脳梗塞等が起こるおそれがある）。

6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

- ** (1) 妊婦又は妊娠している可能性のある女性には投与しないこと。また、投与中に妊娠が判明した場合には、直ちに投与を中止すること。[妊娠中期及び末期にアンジオテンシン変換酵素阻害剤又はアンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤を投与された患者で羊水過少症、胎児・新生児の死亡、新生児の低血圧、腎不全、高カリウム血症、頭蓋の形成不全及び羊水過少症によると推測される四肢の拘縮、頭蓋顔面の変形、肺の低形成等があらわれたとの報告がある。また、海外で実施されたレトロスペクティブな疫学調査で、妊娠初期にアンジオテンシン変換酵素阻害剤を投与された患者群において、胎児奇形の相対リスクは降圧剤が投与されていない患者群に比べ高かったとの報告がある。]
- ** (2) 妊娠する可能性のある女性に投与する場合には、本剤の投

与に先立ち、代替薬の有無等も考慮して本剤投与の必要性を慎重に検討し、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。また、投与が必要な場合には次の注意事項に留意すること。

- 本剤投与開始前に妊娠していないことを確認すること。本剤投与中も、妊娠していないことを定期的に確認すること。投与中に妊娠が判明した場合には、直ちに投与を中止すること。
- 次の事項について、本剤投与開始時に患者に説明すること。また、投与中も必要に応じ説明すること。
 - 妊娠中に本剤を使用した場合、胎児・新生児に影響を及ぼすリスクがあること。
 - 妊娠が判明した又は疑われる場合は、速やかに担当医に相談すること。
 - 妊娠を計画する場合は、担当医に相談すること。

[妊娠していることが把握されずアンジオテンシン変換酵素阻害剤又はアンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤を使用し、胎児・新生児への影響（腎不全、頭蓋・肺・腎の形成不全、死亡等）が認められた例が報告されている^{1),2)}。]

- 授乳中の婦人に投与することを避け、やむを得ず投与する場合には、授乳を中止させること。[動物実験（ラット）で乳汁中へ移行することが認められている。]

7. 小児等への投与

小児等に対する安全性は確立していない（使用経験がない）。

8. 適用上の注意

薬剤交付時：PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。（PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔を起こして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている。）

9. その他の注意

インスリン又は経口血糖降下剤の投与中にアンジオテンシン変換酵素阻害剤を投与することにより、低血糖が起こりやすいとの報告がある。


【薬物動態】

1. 生物学的同等性試験

イミダプリル塩酸塩錠10mg「日医工」及び標準製剤を、クロスオーバー法によりそれぞれ1錠（イミダプリル塩酸塩として10mg）健康成人男子に絶食単回経口投与して血漿中イミダプリル濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ（AUC, Cmax）について90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、log(0.8)～log(1.25)の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された。³⁾

| | 判定パラメータ | | 参考パラメータ | |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | AUC ₀₋₂₄ (ng·hr/mL) | C _{max} (ng/mL) | T _{max} (hr) | t _{1/2} (hr) |
| イミダプリル塩酸塩錠10mg「日医工」 | 162.8±54.2 | 31.78±13.73 | 2.1±0.5 | 2.84±0.84 |
| 標準製剤（錠剤, 10mg） | 162.3±52.7 | 32.51±13.66 | 2.2±0.5 | 2.66±0.51 |

（1錠投与，Mean±S. D., n=20）



血漿中濃度並びにAUC, Cmax等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。


2. 溶出挙動

イミダプリル塩酸塩錠10mg「日医工」は、日本薬局方医薬品各条に定められたイミダプリル塩酸塩錠の溶出規格に適合していることが確認されている。⁴⁾

【有効成分に関する理化学的知見】

一般名：イミダプリル塩酸塩 (Imidapril Hydrochloride)

化学名：(4*S*)-3-[(2*S*)-2-[(1*S*)-1-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropylamino]propanoyl]-1-methyl-2-oximidazolidine-4-carboxylic acid monohydrochloride



分子式：C₂₀H₂₇N₃O₆ · HCl

分子量：441.91

性状：白色の結晶である。

メタノールに溶けやすく、水にやや溶けやすく、エタノール(99.5)にやや溶けにくい。

本品1.0gを水100mLに溶かした液のpHは約2である。

融点：約203℃(分解)

【取り扱い上の注意】

安定性試験

本品につき加速試験(40℃, 相対湿度75%, 6ヵ月)を行った結果、イミダプリル塩酸塩錠10mg「日医工」は通常の市場流通下において3年間安定であることが推測された。⁵⁾

【包装】

イミダプリル塩酸塩錠10mg「日医工」

100錠(10錠×10; PTP)

【主要文献】

- 1) 阿部真也 他：周産期医学, 2017; 47: 1353-1355
- 2) 齊藤大祐 他：鹿児島産科婦人科学会雑誌, 2021; 29: 49-54
- 3) 前田 彰 他：医学と薬学, 60(3), 493(2008)
- 4) 日医工株式会社 社内資料：溶出試験
- 5) 日医工株式会社 社内資料：安定性試験

【文献請求先】

主要文献欄に記載の文献・社内資料は下記にご請求下さい。

日医工株式会社 お客様サポートセンター

〒930-8583 富山市総曲輪1丁目6番21

☎ (0120)517-215

Fax (076)442-8948