



苦味健胃剤

500g



# 日本薬局方 センブリ・重曹散

Swertia and Sodium Bicarbonate  
Powder

製造販売元



日本ジェネリック株式会社  
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

**	2018年 2月改訂(第3版)
*	2012年11月改訂
	日本標準商品分類番号 872339
	承認番号 16000AM201680000
	薬価収載 2008年9月
	販売開始 2008年11月
	再評価結果 1990年3月

貯法：密閉容器、室温保存  
使用期限：外箱に表示

**	<b>【禁忌(次の患者には投与しないこと)】</b>
	(1)ナトリウム摂取の制限を必要とする患者(高ナトリウム血症、浮腫、妊娠高血圧症候群等)[ナトリウムの貯留増加により、症状が悪化するおそれがある]
	(2)ヘキサミンを投与中の患者(「2.相互作用」の項参照)

### 【組成・性状】

販売名	センブリ・重曹散「JG」
成分・含量 (100g中)	センブリ末 3g 炭酸水素ナトリウム 70g
添加物	乳糖水和物、トウモロコシデンプン
性状	淡灰黄色で、味は苦い。

### 【効能・効果】

下記消化器症状の改善  
食欲不振、胃部不快感、胃もたれ、嘔気、嘔吐

### 【用法・用量】

通常成人1回0.5~1.0g、1日3回経口投与する。  
なお、年齢、症状により適宜増減する。

### 【使用上の注意】

- 慎重投与(次の患者には慎重に投与すること)
  - 重篤な消化管潰瘍のある患者[炭酸水素ナトリウムを配合しているため、症状が悪化するおそれがある]
  - 腎障害のある患者[ナトリウム貯留による浮腫があらわれるおそれがある]
  - 心不全の患者、高血圧症の患者[ナトリウム過剰により、これらの症状が悪化するおそれがある]
  - 肺機能障害のある患者[呼吸性アルカローシスになるおそれがある]
  - 低クロル性アルカローシス等の電解質失調の患者[症状が悪化するおそれがある]



苦味健胃剤

500g



# 日本薬局方 センブリ・重曹散

Swertia and Sodium Bicarbonate  
Powder

製造販売元



日本ジェネリック株式会社  
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

\*\*2.相互作用  
(1)併用禁忌(併用しないこと)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ヘキサミン ヘキサミン 静注液	本剤はヘキサミンの効果を減弱させることがある。	ヘキサミンは酸性尿中でホルムアルデヒドとなり抗菌作用を発現するが、本剤は尿のpHを上昇させヘキサミンの効果を減弱させる。

(2)併用注意(併用に注意すること)

本剤は制酸作用等を有しているため、他の薬剤の吸収・排泄にも影響を与えることがある。

3.高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているため減量するなど注意すること。

GS1



(01)14987792212756

製造番号

使用期限

