※※2020年6月改訂(第25版) ※2020年3月改訂

向精神作用性抗てんかん剤 躁状態治療剤 日本標準商品分類番号 871139、871179

貯法 遮光、室温保存

遮光、室温保存 **使用期限**

包装に表示の使用期限内 に使用すること。 処方箋医薬品:注意-医師等の処方箋により使用すること

カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」 カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」 カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」

CARBAMAZEPINE TABLETS, FINE GRANULES "FUJINAGA" カルバマゼピン製剤

	錠100mg	錠200mg	細粒50%
承認悉是	22700AMX00174		
	2015年6月		2015年6月
販売開始		1978年6月	1978年6月
効能追加	-	1991年11月	1992年2月

【禁忌】(次の患者には投与しないこと)

- 1. 本剤の成分又は三環系抗うつ剤に対して過敏症の既往歴のある患者
- 2. 重篤な血液障害のある患者[副作用として血液障害が報告されており、血液の異常をさらに悪化させるおそれがある。]
- 3. 第2度以上の房室ブロック、高度の徐脈(50拍/分未満) のある患者[刺激伝導を抑制し、さらに高度の房室ブロッ クを起こすことがある。]
- ※4.ボリコナゾール、タダラフィル(アドシルカ)、リルピビリン、マシテンタン、チカグレロル、グラゾプレビル、エルバスビル、ダクラタスビル・アスナプレビル・ベクラブビル、アスナプレビル、ドルテグラビル・リルピビリン、ソホスブビル・ベルパタスビル、ビクテグラビル・エムトリシタビン・テノホビルアラフェナミドを投与中の患者[これらの薬剤の血中濃度が減少するおそれがある。](「相互作用」の項参照)
 - 5. ポルフィリン症の患者[ポルフィリン合成が増加し、症状が悪化するおそれがある。]

【組 成 ・ 性 状】

1.組 成

1錠又は細粒1g中にそれぞれ次の成分を含有

販 売 名	有効成分	添 加 物
カルバマゼピン錠	日本薬局方	結晶セルロース、ヒドロキシ
100mg「フジナガ」	カルバマゼピン	プロピルスターチ、ヒドロキ
	100mg	シプロピルセルロース、ステ
カルバマゼピン錠	日本薬局方	アリン酸マグネシウム
200mg「フジナガ」	カルバマゼピン	
	200mg	
カルバマゼピン細	日本薬局方	トウモロコシデンプン、D-マ
粒50%「フジナガ」	カルバマゼピン	ンニトール、ヒプロメロース
	500mg	

2. 製剤の性状

みルパロストラルでは「20mg「フジナガ」:白色の素錠である。 カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」:白色の素錠である。 カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」:白色の細粒である。

販 売 名	識別コード		外形等	
カルバマゼピン錠 100mg「フジナガ」	<>>L100	L100		
		重さ(mg)・	·直径(mm)·	厚さ(mm)
		140	8.0	3.1
カルバマゼピン錠 200mg「フジナガ」	<>>L200	(C) L200		
		重さ(mg)・	直径(mm)·	厚さ(mm)
		280	9.0	4.0

【効 能 又 は 効 果】

- 1.精神運動発作、てんかん性格及びてんかんに伴う精神障害、てんかんのけいれん発作:強直間代発作(全般けいれん発作、大発作)
- 2. 躁病、躁うつ病の躁状態、統合失調症の興奮状態
- 3. 三叉神経痛

【用 法 及 び 用 量】

1.精神運動発作、てんかん性格及びてんかんに伴う精神障害、てんかんのけいれん発作:強直間代発作(全般けいれん発作、大発作)の場合

カルバマゼピンとして通常、成人には最初 1 日量 200 ~ 400mgを 1 ~ 2 回に分割経口投与し、至適効果が得られるまで(通常 1 日 600mg)徐々に増量する。症状により 1 日 1,200mgまで増量することができる。小児に対しては、年齢、症状に応じて、通常 1 日量 100 ~ 600mg を分割経口投与する。

- **2. 躁病、躁うつ病の躁状態、統合失調症の興奮状態の場合** カルバマゼピンとして通常、成人には最初 1 日量 200 ~ 400mgを 1 ~ 2 回に分割経口投与し、至適効果が得られるまで(通常 1 日600mg) 徐々に増量する。症状により 1 日 1,200mgまで増量することができる。
- 3. 三叉神経痛の場合

カルバマゼピンとして通常、成人には最初1日量200~400mgからはじめ、通常1日600mgまでを分割経口投与するが、症状により1日800mgまで増量することができる。小児に対しては、年齢、症状に応じて適宜減量する。

【使用上の注意】

- 1. 慎重投与(次の患者には慎重に投与すること)
- (1)心不全、心筋梗塞等の心疾患又は第1度の房室ブロック のある患者[刺激伝導を抑制し心機能を悪化させること がある。]
- (2)排尿困難又は眼圧亢進等のある患者[抗コリン作用を有するため症状を悪化させることがある。]
- (3)高齢者[「高齢者への投与」の項参照]
- (4)肝障害、腎障害のある患者[このような患者では代謝・ 排泄機能が低下しているため、血中濃度をモニターする など慎重に投与すること。]
- (5)薬物過敏症の患者
- (6)甲状腺機能低下症の患者[甲状腺ホルモン濃度を低下させるとの報告がある。]

2. 重要な基本的注意

- (1)連用中における**投与量の急激な減少ないし投与の中止**により、**てんかん重積状態**があらわれることがあるので、 投与を中止する場合には、徐々に減量するなど慎重に行 うこと。
 - なお、高齢者、虚弱者の場合は特に注意すること。
- (2)連用中は定期的に**肝・腎機能、血液検査**を行うことが望ましい。
- (3) 眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こる ことがあるので、本剤投与中の患者には**自動車の運転等 危険を伴う機械の操作に従事させないよう**注意すること。
- (4)統合失調症の興奮状態への使用に際しては、抗精神病薬で十分な効果が認められない場合に使用すること。
- (5)抗てんかん剤の投与により発作が悪化又は誘発されることがある。混合発作型あるいは本剤が無効とされている小発作(欠神発作、非定型欠神発作、脱力発作、ミオクロニー発作)の患者に本剤を投与する場合には状態に注意し、発作が悪化あるいは誘発された場合には本剤の投与を徐々に減量し中止すること。

(6) 眠気、悪心・嘔吐、眩暈、複視、運動失調等の症状は過量投与の徴候であることが多いので、このような症状があらわれた場合には、至適有効量まで徐々に減量すること。特に投与開始初期にみられることが多いため、低用量より投与を開始することが望ましい。

3. 相互作用

本剤は多くの薬剤との相互作用が報告されているが、可能性のあるすべての組み合わせについて検討されているわけではないので、他剤と併用したり、本剤又は併用薬を休薬する場合には注意すること。特に本剤の主たる代謝酵素はチトクロームP450 3A4であり、またチトクロームP450 3A4をはじめとする代謝酵素を誘導するので、これらの活性に影響を与える又はこれらにより代謝される薬剤と併用する場合には、可能な限り薬物血中濃度の測定や臨床症状の観察を行い、用量に留意して慎重に投与すること。

また、カルバマゼピンの主たる代謝物であるカルバマゼピン-10,11-エポキシドの代謝に関与する酵素はエポキシド加水分解酵素であり、この酵素を阻害する薬剤と併用する場合には、カルバマゼピン-10,11-エポキシドの血中濃度が上昇するおそれがあるため、可能な限り臨床症状の観察を行い、用量に留意して慎重に投与すること。

(1)併用禁忌(併用しないこと)

	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
	ボリコナゾール (ブイフェンド) タダラフィル (アドシルカ) リルピビリン	これらの薬剤の血中 濃度が減少し作用が 減弱するおそれがあ る。	本剤の肝薬物代謝酵素誘導作用によりこれらの薬剤の代謝が 促進される。
*	(エジュラント) マシテンタン (オプスミット)		
*	チカグレロル (ブリリンタ)		
*	(フリリンフ) グラゾプレビル (グラジナ)		
*	エルバスビル (エレルサ)		
*	ダクラタスビル・ アスナプレビル・ ベクラブビル (ジメンシー 配合錠)		
*	アスナプレビル (スンベプラ)		
*	ドルテグラビル・リルピビリン (ジャルカ配合錠)		
*	ソ ホスブビル・ ベルパタスビル (エプクル – サ 配合錠)		本剤のP-gp及び代謝酵素の誘導作用により、これら薬剤の血漿中濃度が低下するおそれがある。
*	ビクテグラビル・エムトリシャビン・テノェナミド (ビクタルビ配合錠)	ビクテグラビル及び テノホビルアラフェ ナミドの血漿中農 が低下するため、こ の薬剤の効薬利に対す し、この薬剤は対す る耐性が発現する可 能性がある。	本剤のP-gp及び代 謝酵素誘導作用によ る。

(2)併用注意(併用に注意すること)

/	7717 - A. C.				
	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子		
	MAO阻害剤	発汗、不穏、全身けいれん、異常高熱、 昏睡等の症状があら われるおそれがある。	本剤は三環系抗うつ 剤と構造が類似して いるため同様の症状 が起こる可能性がある。		
	炭酸リチウム	精神神経系症状(錯乱、 粗大振戦、失見当識等) があらわれたとの報 告がある。	明確な機序は不明であるが、十トリウスで 大け、大に導速を に対する両関連して に対作用が関連している の可能性が考えられ でいる。		

メトクロプラミド	神経症状(歩行障害、 運動失調、眼振、複視、 下肢反射亢進)があら われたとの報告がある。	機序不明
アルコール	相互に作用が増強されるおそれがある。 過度のアルコール摂取は避ける。	両剤とも中枢神経抑制作用を有するため。
中枢神経抑制剤 ハロペリドール チオリダジン	相互に作用が増強されることがある。	
利尿剤(ナトリウム喪失性)	低ナトリウム血症・ SIADHがあらわれる ことがある。ナトリ ウム喪失性以外の利 尿剤の使用を考慮する。	共に血清中のナトリ ウムを低下させるこ とがある。
イソニアジド	イソニアジドの肝毒性を増強することがある。また、本剤の血中濃度が急速に上昇し、中毒症状(眠気悪心・嘔吐、眩暈等)があらわれることがある。	本剤の肝薬物代別というでは、対しているでは、は、対しているでは、には、対しているでは、対しているでは、対しては、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しないないがは、対しないは、対しないないないは、対しないないないは、対しないないないは、対しないないないないないないないないないないないないないないないないないないない
フルデンシン・イス アルデン・フルミスルー・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・	本剤の血中濃度が急速に上昇し、中毒症状(眠気、悪心・嘔吐、眩暈等)があらわれることがある。	これらの薬剤が本剤の代謝を阻害する。
アセタゾラミド クエチアピン	クエチアピンの血中 濃度が低下すること がある。また、本剤 の代謝物の血中濃度 が上昇することがある。	機序不明 本剤の肝薬物代謝酵素誘導作用によりクエチアピンの代謝が、 クエチアピンなまた、 クエチアピンが、 クエチアピンがある。また、 の代謝物の代謝を阻害する。
イトラコナゾール テラプレビル	これらの薬剤の血中 濃度が低下することがある。また、本剤の血中濃度が上昇することがある。	本剤の肝薬物代謝酵素誘導作用によりこれらの薬剤の代謝が 促進される。また、 これらの薬剤が本剤 の代謝を阻害する。
クロバザム パロキセチン	これらの薬剤の血中 濃度が低下すること がある。また、本剤の血中濃度が上昇することがある。	本剤の肝薬物代謝酵素誘導作用によりで 表誘導作用によりで れらの薬剤の代謝が、 促用による本剤の 中濃度上昇の機序 に である。
フェノバルビター ル リファンピシン	本剤の血中濃度が低下することがある。	これらの薬剤の肝薬 物代謝酵素誘導作用 により本剤の代謝が 促進される。
フェニトイン	本剤の血中濃度が低 下することがある。 また、フェニトイン の血中濃度を上昇又 は低下させることが ある。	両剤とも肝薬物代謝 酵素誘導作用を有す るため、相互に代謝 が促進される。また、 代謝競合により、フェ ニトインの代謝が阻 害される。

バルプロ酸	バルプロ酸の血中濃度を低っことがある。また、本剤及び本剤の代謝物の血中濃度が上昇又は本剤の血中濃度が出まが低下することがある。	本剤の肝薬物代謝酵素 誘導作用によりバルプロ酸の代謝が促進される。また、バルプロ酸 は本剤の代謝物の代謝 を阻害する。バルプロ酸 との併用により本剤 の血中濃度が上昇又は 低下したとの報告があるが、機序は不明である。
プリミドン	相互に血中濃度が低 下することがある。 また、本剤の代謝物 の血中濃度が上昇す ることがある。	両剤の肝薬物代謝酵素所に代謝なよりでは 素誘導作用に進るこれました。 では では では では では では では では では では では では では
エファビレンツ	相互に血中濃度が低下することがある。	両剤の肝薬物代謝酵素誘導作用により相 互に代謝が促進されると考えられる。
テオフィリン アミノフィリン 水和物	,	本剤の肝薬物代謝酵素誘導作用によりデオフィリンの代謝が 促進される。また、 使用による本剤の血 中濃度低下の機序は 不明である。
「抗剤	を減弱することがある。	本剤の肝薬物代謝酵素誘導作用によりこれらの薬剤の代謝が促進される。
黄体・卵胞ホルモン剤 ※ ドロスピレノン・エチニルコストラジオール等	正性器出血の発現率 が増大するおそれが ある。	

	ソリフェナシン クマリン系抗凝血 剤	これらの薬剤の作用を減弱することがある。	本剤の肝薬物代謝酵素 誘導作用によりこれら の薬剤の代謝が促進さ
**** ***	免疫 シタエ た イイゲソスダニラトタテアセオパイポ 悪しり カカクベ性リマフラニサロパレミムキリシルブナ 種バリタテス性リマフラニサロパレミムキリシルブナ 種バンタチェニブブブブェテリニブチニア 割ニブンンス ブブブブブ シンスプ ブブブブブ アセオパイポ 悪ケンカーグ カージー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		本剤のP-gp及び代謝酵素の誘導作用により、レンバがアファ
*	感中では、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、アリカーのでは、		血中濃度が低下する おそれがある。 本剤の肝薬物代謝酵素 誘導作用によりこれら の薬剤の代謝が促進さ れる。
	ホスアプレピタン トメグルミン 非脱分極性筋弛緩 剤 パンクロニウム 等 ゴギシン アルベンダゾール		本剤の肝薬物代謝酵素誘導作用によりホスアプレビタント本体アプレビタントを作りの活性を依まされ、血中濃度が低下する。 機序不明
*	ヒドロキシクロロ キン	本剤の作用が減弱する可能性がある。	
	ミラベグロン	ミラベグロンの作用を減弱することがある。	本剤の肝薬物代謝酵素誘導作用及びP糖蛋白誘導作用により、ミラベグロンの代謝が促進され、血中濃度が低下する。
	シクロホスファミ ド	シクロホスファミド の作用を増強するこ とがある。	本剤の肝薬物代謝酵素誘導作用により、 シクロホスファミド の活性代謝物の濃度 が上昇する。
	カスポファンギン	カスポファンギンの 血中濃度が低下する おそれがある。	本剤がカスポファン ギンの取り込み輸送 過程に影響し、カス ポファンギンのクリ アランス誘導が起こる。

アセトアミノフェン	アセトアミノフェンの作用を減る。とというでは、肝障害を生のなるとの報告がある。	本剤の肝薬物代謝 酵素が出まり りアンの代謝が促血 進され、すること が低下すること が低下といいであると をリアンからに でいいでは でいいでは でいいでは でいいでは でいいでは でいいでは でいいでは でいいでは でいいでは でいる。
ラモトリギン	ラモトリギンの血 中濃度を低下させ ることがある。	肝におけるラモト リギンのグルクロ ン酸抱合が促進さ れる。
ダビガトラン エテキシラー ト	ダビガトランの作 用を減弱すること がある。	本剤のP糖蛋白誘導作用により、ダビガトランの血中濃度が低下することがある。
セイヨウオト ギリソウ(St. John's Wort、 セント・ジョー ンズ・ワート) 含有食品	本剤の代謝が促進された。本剤の自動をでは、本剤を表している。本剤は、大力をないでは、力をない。ないでは、力をない。ないでは、大力を表している。ないでは、大力を表している。ないでは、大力を表している。ないでは、大力を表している。と、大力を表している。と、大力を表している。	セイヨウオトギリ ソウの肝薬物代謝 酵素誘導作用によ ると考えられてい る。
グレープフルー ツジュース	本剤の代謝が抑制 され血中濃度が上 昇するおそれがあ るので、本レープラ 時は、グレーツジューよう 摂取しないよ 意すること。	グレープフルーツ ジュースに含まれ る成分が本剤の小 腸での代謝酵素を 阻害するためと考 えられている。

4. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

(1)重大な副作用

- 1)再生不良性貧血、汎血球減少、白血球減少、 無顆粒球症、貧血、溶血性貧血、赤芽球療、 血小板減少(頻度不明):重篤な血液障害があ らわれることがあるので、定期的に血液検査 を実施するなど観察を十分に行い、異常が認 められた場合には投与を中止し、適切な処置 を行うこと。
- ※2)中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis:TEN)、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、多形紅斑、急性汎発性発疹性膿疱症、紅皮症(剥脱性皮膚炎)(頻度不明):重篤な皮膚症状があらわれることがあるので、観察を十分に行い、発熱、眼充血、顔面の腫脹、口唇・口腔粘膜や陰部のびらん、皮膚や粘膜の水疱、多数の小膿疱、紅斑、咽頭痛、瘙痒、全身倦怠感等の異常が認められた場合には直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。また、これらの症状のほとんどは本剤の投与開始から3ヵ月以内に発症することから、特に投与初期には観察を十分に行うこと。
 - 3) SLE様症状(頻度不明): SLE様症状(蝶形紅斑 等の皮膚症状、発熱、関節痛、白血球減少、 血小板減少、抗核抗体陽性等)があらわれるこ とがあるので、観察を十分に行い、異常が認 められた場合には投与を中止し、適切な処置 を行うこと。
 - 4) 過敏症症候群(頻度不明): 初期症状として発熱、発疹がみられ、さらにリンパ節腫脹、関節痛、白血球増加、好酸球増多、異型リンパ球出現、肝脾腫、肝機能障害等の臓器障害を伴う遅発性の重篤な過敏症状があらわれることがある。また、発疹、発熱、肝機能障害等の症状が再燃あるいは遷延化することがあるので注意すること。なお、ヒトヘルペスウイルス6(HHV-6)等のウイルス再活性化を伴うことが多い。このような症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

- 5) 肝機能障害、黄疸(頻度不明): 胆汁うっ滞性、 肝細胞性、混合型、又は肉芽腫性の肝機能障害、黄疸があらわれ、劇症肝炎等に至ること があるので、定期的に肝機能検査を行うなど 観察を十分に行うこと。異常が認められた場 合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- ※6)急性腎障害(間質性腎炎等)(頻度不明):重 篤な腎障害があらわれることがあるので、定 期的に腎機能検査を実施するなど観察を十分 に行い、異常が認められた場合には投与を中 止し、適切な処置を行うこと。
 - 7) PIE症候群、間質性肺炎(頻度不明):発熱、 咳嗽、呼吸困難、喀痰、好酸球増多、肺野の 浸潤影を伴うPIE症候群、間質性肺炎があら われることがあるので、このような症状があ らわれた場合には投与を中止し、適切な処置 を行うこと。
 - 8) **血栓塞栓症**(頻度不明): 肺塞栓症、深部静脈 血栓症、血栓性静脈炎等の血栓塞栓症があら われることがあるので、観察を十分に行い、 異常が認められた場合には投与を中止し、適 切な処置を行うこと。
 - 9)**アナフィラキシ**ー(頻度不明):蕁麻疹、血管性浮腫、循環不全、低血圧、呼吸困難等を伴うアナフィラキシーがあらわれることがあるので、このような症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
 - 10) うっ血性心不全、房室ブロック、洞機能不全、徐脈(頻度不明):うっ血性心不全、房室ブロック、洞機能不全、徐脈があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
 - 11) **抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)** (頻度不明):低ナトリウム血症、低浸透圧血症、尿中ナトリウム排泄量の増加、高張尿、けいれん、意識障害等を伴う抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)があらわれることがあるので、このような症状があらわれた場合には投与を中止し、水分摂取の制限等適切な処置を行うこと。
 - 12) 無菌性髄膜炎(頻度不明):項部硬直、発熱、 頭痛、悪心・嘔吐あるいは意識混濁等を伴う 無菌性髄膜炎があらわれることがあるので、 このような症状があらわれた場合には投与を 中止し、適切な処置を行うこと。
- 13) **悪性症候群**(頻度不明):本剤の投与により発熱、意識障害、無動緘黙、強度の筋強剛、嚥下困難、頻脈、血圧の変動、発汗等があらわれることがある。このような場合には、投与を中止し、体冷却、水分補給等の全身管理と共に適切な処置を行うこと。本剤の急な中止により発現することもあるので、本剤の急な投与中止は行わないこと。また、悪性症候群は抗精神病薬との併用時に発現しやすいので特に注意すること。なお、本症発症時には白血球の増加や血清CK(CPK)の上昇がみられることが多く、また、ミオグロビン尿を伴う腎機能の低下をみることがある。

(2) その他の副作用

てVJIEVJEIJF用			
	頻 度 不 明		
過敏症	猩紅熱様発疹、麻疹様発疹、中 毒疹様発疹、光線過敏症、血管 炎、血管浮腫、瘙痒症、蕁麻疹、 呼吸困難、潮紅		
皮膚	色素沈着、痤瘡、丘疹、多形結 節性紅斑、紫斑、多毛、苔癬様 角化症、爪の障害(爪甲脱落症、 爪の変形、爪の変色等)		
筋骨格系	筋けいれん、筋脱力、関節痛、 筋痛		

ポルフィリン症、巨赤芽球性貧血、 白血球増多、好酸球増多症、網 状赤血球増加症、リンパ節腫脹
AST(GOT)の上昇、ALT(GPT) の上昇、Al-Pの上昇、 γ-GTP の上昇
蛋白尿、BUNの上昇、クレアチニンの上昇、乏尿、尿閉、頻尿、血尿
注意力・集中力・反射運動能力 等の低下、立ちくらみ、抑うつ、 頭痛・頭重、脱力、倦怠感、興奮、 運動失調、不随意運動(振戦、ア ステリキシス等)、言語障害、錯 乱、眠気、眩暈、幻覚(視覚、聴 覚)、ふらつき、せん妄、知覚異 常、インポテンス、末梢神経炎、 口顔面ジスキネジー、舞踏病ア テトーゼ、麻痺症状、攻撃的行動、 激越、意識障害、鎮静、記憶障 害
複視、霧視、調節障害、眼振、 異常眼球運動(眼球回転発作)、 水晶体混濁、結膜炎、眼圧上昇
血圧低下、血圧上昇、不整脈、 刺激伝導障害
食欲不振、悪心・嘔吐、便秘、 下痢、口渴、膵炎 ^{油)} 、口内炎、 舌炎、腹痛、大腸炎
ビタミンD・カルシウム代謝異常(血清カルシウムの低下等)、甲状腺機能検査値の異常(T4値の低下等)、血清葉酸値低下、女性化乳房、乳汁漏出、プロラクチン上昇、低ナトリウム血症、骨軟化症、骨粗鬆症、高血糖
発熱、味覚異常、聴覚異常(耳鳴、 聴覚過敏、聴力低下、音程の変 化等)、脱毛、浮腫、発汗、コレ ステロール上昇、CK(CPK)値上 昇、トリグリセリド上昇、体液 貯留、免疫グロブリン低下(IgA、 IgG等)、体重増加、CRP上昇、 感冒様症状(鼻咽頭炎、咳嗽等)

- 注1) 投与を中止すること。
- 注2) 定期的に視力検査を行うことが望ましい。

5. 高齢者への投与

減量するなど注意すること[一般に高齢者では生理機能が低下している。](「重要な基本的注意」の項参照)。

6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

- (1)妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。やむを得ず本剤を妊娠中に投与する場合には、可能な限り他の抗てんかん剤との併用は避けることが望ましい[妊娠中に本剤が投与された患者の中に、奇形(二分脊椎を含む)を有する児や発育障害の児を出産した例が多いとの疫学的調査報告がある。また、本剤の単独投与に比べ、本剤と他の抗てんかん剤(特にバルプロ酸ナトリウム)の併用では口蓋裂、口唇裂、心室中隔欠損等の奇形を有する児の出産例が多いとの疫学的調査報告がある。なお、尿道下裂の報告もある。]。
- (2)分娩前に本剤又は他の抗てんかん剤と併用し連用した場合、出産後新生児に禁断症状(けいれん、呼吸障害、嘔吐、下痢、摂食障害等)があらわれるとの報告がある。
- (3)妊娠中の投与により、新生児に出血傾向があらわれることがある。
- (4)妊娠中の投与により、葉酸低下が生じるとの報告がある。

(5)授乳中の婦人には治療上の有益性が危険性を上 回ると判断される場合にのみ投与すること[母乳 中へ移行することが報告されている。]。

7. 過量投与1)

- (1) **症状**:最初の徴候・症状は、通常服用1~3時間後にあらわれる(「重要な基本的注意」の項参照)。中枢神経障害(振戦、興奮、けいれん、意識障害、昏睡、脳波変化等)が最も顕著で、心血管系の障害(血圧変化、心電図変化等)は通常は軽度である。また、横紋筋融解症があらわれることがある。
- (2) **処置**: 特異的な解毒剤は知られていない。通常、次のような処置が行われる。
 - ・催吐、胃内容物の吸引、胃洗浄、血液透析。 必要に応じ活性炭投与。
 - ・気道確保。必要に応じ気管内挿管、人工呼吸、 酸素吸入。
 - ・低血圧に対しては両下肢挙上及び血漿増量剤 投与。必要に応じ昇圧剤を投与。
 - ・けいれんにはジアゼパムを静注(ただし、ジアゼパムによる呼吸抑制、低血圧、昏睡の悪化に注意)。 適切な処置を行った後、呼吸、心機能、血圧、 体温等を引き続き数日間モニターする。

8. 適用上の注意

薬剤交付時: PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること(PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている。)。

9. その他の注意

- (1)他の抗てんかん剤に投与変更する場合には、増悪 を防止するため、通常、ジアゼパム又はバルビツ ール酸系化合物の併用を行うことが望ましい。
- (2) ラットにカルバマゼピンを長期間経口投与した 実験(25、75及び250mg/kg、2年間)で、雌に肝 腫瘍の発生が用量依存性をもって有意に認めら れたとの報告がある。
- (3)血清免疫グロブリン(IgA、IgG等)の異常があら われることがある。
- (4) 男性の生殖能力障害と精子形成異常の報告がある。
- (5)本剤と他の抗てんかん薬(フェニトイン、フェノバルビタール)との間に交差過敏症(過敏症症候群を含む皮膚過敏症)を起こしたとの報告がある。
- (6)日本人を対象としたレトロスペクティブなゲノムワイド関連解析において、本剤による皮膚粘膜限症候群、中毒性表皮壊死融解症及び過敏症症候群等の重症薬疹発症例のうち、HLA-A*3101保有者は58%(45/77)であり、重症薬疹を発症しなかった集団のHLA-A*3101保有者は13%(54/420)であったとの報告がある。なお、HLA-A*3101アレルの頻度は日本人では0.071-0.120との報告がある。

漢民族(Han-Chinese)を祖先にもつ患者を対象とした研究では、本剤による皮膚粘膜眼症候群及び中毒性表皮壊死融解症発症例のうち、ほぼ全例が*HLA-B*1502*保有者であったとの報告がある。一方、日本人を対象とした研究において本剤による重症薬疹発症例と*HLA-B*1502*保有との明らかな関連性は示唆されていない。

なお、*HLA-B*1502*アレルの頻度は漢民族では 0.019-0.124、日本人では0.001との報告がある。

(7)海外で実施された本剤を含む複数の抗てんかん薬における、てんかん、精神疾患等を対象とした199のプラセボ対照臨床試験の検討結果において、自殺念慮及び自殺企図の発現のリスクが、抗てんかん薬の服用群でプラセボ群と比較して約2倍高く(抗てんかん薬服用群:0.43%、プラセボ群:0.24%)、抗てんかん薬の服用群では、プラセボ群と比べ1000人あたり1.9人多いと計算された(95%信頼区間:0.6-3.9)。また、てんかん患者のサブグループでは、プラセボ群と比べ1000人あたり2.4人多いと計算されている。


【薬 態】

1. 生物学的同等性試験?)

カルパマゼピン錠100mg「フジナガ」と標準製剤を、クロスオーバー 法によりそれぞれ1錠(カルバマゼピンとして100mg)健康成人男 子12名に空腹時単回経口投与して血漿中濃度を測定し、得られた 薬物動態パラメータについて統計解析を行った結果、両剤の生物 学的同等性が確認された。

	$\begin{array}{c} \mathrm{AUC}_{\scriptscriptstyle (0\text{-}144\mathrm{hr})} \\ \mathrm{(hr} \cdot \mu\mathrm{g/mL)} \end{array}$	Cmax (µg/mL)	Tmax (hr)	T _{1/2} (hr)
カルバマゼピン 錠100mg「フジナガ」	98.9±21.2	1.72±0.18	2.3±2.0	51.9±17.0
標準製剤 (錠剤、100mg)	98.6±23.4	1.68±0.29	2.6±1.3	49.6±13.4

 $(Mean \pm S.D..n = 12)$



血漿中濃度並びにAUC、Cmax等のパラメータは、被験者の選択、 体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性があ

2. 有効血中濃度3)

有効血中カルバマゼピン濃度は4~12μg/mL(てんかんの場合)と されている。

カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」、カルバマゼピン錠200mg「フ ジナガ」及びカルバマゼピン細粒50%「フジナガ」は、日本薬局方 外医薬品規格第3部に定められたカルバマゼピン錠及びカルバマ ゼピン細粒の溶出規格に適合していることが確認されている。

薬 理】 効

1. 抗けいれん作用5

カルバマゼビンはラットにおける電気ショックけいれんに対し フェノバルビタールとほとんど同等の抑制作用を示し、マウスに おけるストリキニーネけいれんに対しては十分なけいれん抑制作用を示さないが、カルバマゼピン100mg/kg(経口)投与では、フェ ニトインやメフェネシンと比較して明らかにけいれんの発現を遅 延させる。

2. 抗興奮作用5~7)

カルバマゼピンはマウスを用いた行動薬理学的試験において、闘 争行動抑制作用、常同行動抑制作用、麻酔増強作用を示す。 カルバマゼピンはウサギを用いた電気生理学的試験において、嗅 球から大脳辺縁系に至る情動経路(嗅球-扁桃核、嗅球-海馬)の 誘発電位の抑制を示す。

3. 三叉神経痛に対する作用®

カルバマゼピンはネコにおいて、上顎神経の電気刺激に対する三 叉神経脊髄路反応の潜伏期間を延長させる。

【有効成分に関する理化学的知見】

-般名:カルバマゼピン(Carbamazepine)

化学名:5H-Dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamide

分子式: C₁₅H₁₂N₂O 分子量:236.27

構造式:

NH₀

状: 白色~微黄白色の粉末で、においはなく、味は初めないが、 後にわずかに苦い

クロロホルムに溶けやすく、エタノール(95)又はアセトンに やや溶けにくく、水又はジエチルエーテルに極めて溶けに 2 W.

点:189~193℃

【取扱い上の注意】

安定性試験9

カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」(PTP):最終包装製品を用いた

カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」 (PTP): 最終包装製品を用いた 長期保存試験(室温、3年間)の結果、規格の範囲内であり、通常 の市場流通下において3年間安定であることが確認された。 カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」 (プラスチック製瓶): 最終包装製品を用いた相対比較試験(40°で、相対湿度75%、6ヵ月)の結果、通常の市場流通下において3年間安定であることが推測された。 カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」 (PTP): 最終包装製品を用いた 長期保存試験(室温、5年間)の結果、規格の範囲内であり、通常 の市場流通下において5年間安定であることが確認された。 カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」 (プラスチック製瓶): 最終包装製品を用いた相対比較試験(40°で、相対湿度75%、6ヵ月)の結果

製品を用いた相対比較試験(40℃、相対湿度75%、6ヵ月)の結果、 通常の市場流通下において5年間安定であることが推測された

カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」:本剤は処方変更時の相対比較 試験(40℃、相対湿度75%、6ヵ月)の結果、通常の市場流通下に おいて5年間安定であることが推測された。

匀 装

カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」 100錠(PTP) 1,000錠(PTP) 500錠(プラスチック製瓶)

カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」 100錠 (PTP) 1,000錠 (PTP) 500錠(プラスチック製瓶)

カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」100g

【主要文献】

- 1)JPDI 2011 日本薬局方医薬品情報 じほう 2011:472-479 2)藤永製薬社内資料: 生物学的同等性に関する資料
- 3)伊賀立二ほか:薬物投与設計のためのTDMの実際 薬業時報社 1993;126-149
- 4)藤永製薬社内資料:溶出に関する資料
- 5) Theobald W, et al.: Arzneimittelforschung 1963:13(2):122-1256) 中尾健三ほか:薬理と治療 1988:16(3):1189-1190
- 7)中尾健三ほか:薬理と治療 1988;16(3):1191-1206
- 8) Fromm GH, et al.: Neurology 1967;17:275-280
- 9)藤永製薬社内資料:安定性に関する資料

※※【文献請求先・製品情報お問い合わせ先】

主要文献に記載の社内資料につきましても下記にご請求ください。 藤永製薬株式会社 くすり相談室 藤永製薬株式会社

〒103-0027 東京都中央区日本橋2-14-1 フロントプレイス日本橋

TEL: 03-6327-2478 FAX: 03-6327-2479

製造販売元



藤永製薬株式会社 東京都中央区日本橋 2-14-1

販売元



東京都中央区日本橋本町3-5-1