

貯法：室温保存  
有効期間：3年

承認番号	16100AMZ02216
販売開始	1964年10月

ビタミンC製剤  
日本薬局方  
**アスコルビン酸散**  
ビタミンC散「フソー」-100mg  
Vitamin C Powder "FUSO"

## 3. 組成・性状

## 3.1 組成

販売名	ビタミンC散「フソー」-100mg
有効成分	1g中 日局 アスコルビン酸 100mg
添加剤	乳糖水和物、パレイショアンプン

## 3.2 製剤の性状

販売名	ビタミンC散「フソー」-100mg
性状	白色の散剤

## 4. 効能・効果

- (1) ビタミンC欠乏症の予防及び治療（壊血病、メルレル・パロー病）
  - (2) ビタミンCの需要が増大し、食事からの摂取が不十分な際の補給（消耗性疾患、妊産婦、授乳婦、はげしい肉体労働時など）
  - (3) 下記疾患のうち、ビタミンCの欠乏又は代謝障害が関与すると推定される場合
    - ・毛細管出血（鼻出血、歯肉出血、血尿など）
    - ・薬物中毒
    - ・副腎皮質機能障害
    - ・骨折時の骨基質形成・骨癒合促進
    - ・肝斑・雀卵斑・炎症後の色素沈着
    - ・光線過敏性皮膚炎
- (3) の適応に対して、効果がないのに月余にわたって漫然と使用すべきでない。

## 6. 用法・用量

アスコルビン酸として、通常成人1日50～2,000mgを1～数回に分割経口投与する。  
なお、年齢、症状により適宜増減する。

## 9. 特定の背景を有する患者に関する注意

## 9.7 小児等

小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

## 11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

## 11.2 その他の副作用

	頻度不明
消化器	悪心・嘔吐、下痢

## 12. 臨床検査結果に及ぼす影響

- 12.1 各種の尿糖検査で、尿糖の検出を妨害することがある。
- 12.2 各種の尿検査（潜血、ビリルビン、亜硝酸塩）・便潜血反応検査で、偽陰性を呈することがある。

## 14. 適用上の注意

## 14.1 薬剤調製時の注意

本剤は還元性、キレート性が強いので配合変化を起こしやすく、その際、本剤の効力が低下するので注意すること<sup>1)</sup>。

## 18. 薬効薬理

## 18.1 作用機序

ビタミンCの代表的な欠乏症が壊血病であり、出血傾向の増大、骨・歯牙の発育遅延、抗体産生能や創傷治癒能の低下などを起こす。本剤の投与はこれらの疾患や症状に効果があるが、生理的意義や作用は十分明らかではない。コラーゲン生成への関与、毛細血管抵抗性の増強や血液凝固時間の短縮などによる出血傾向の改善、副腎皮質機能への関与（ストレス反応の防止）、メラニン色素生成の抑制などが報告されている<sup>1)</sup>。

## 18.2 コラーゲン形成促進作用

壊血病の病理所見は骨、歯牙及びその他の結合織のコラーゲン合成能の低下によるものと考えられている<sup>2,3)</sup>。壊血病生成食飼育モルモットの皮膚再生を指標にアスコルビン酸の結合織形成に及ぼす影響を調べた実験では、アスコルビン酸の投与により組織のヒドロキシプロリン産生増とともに非コラーゲン性プロリンの減少が認められ、創傷部のプロリン含有物質がコラーゲンに変換されていることを示唆する成績が得られている<sup>4)</sup>。

また、結合織のコラーゲンと類似の組成から成る上皮基底膜の合成もアスコルビン酸依存性であり、壊血病の徴候のいくつかが基底膜の合成不全によることが示されている<sup>5)</sup>。

## 18.3 副腎防禦作用

ラットにエピネフリン注射によるストレスを負荷すると、好酸球の減少とともに組織学的には副腎の警告反応を示唆する像が得られるが、アスコルビン酸を前投与しておいた動物では有意の好酸球増加が認められ、また組織学的に副腎は正常で、副腎防禦作用を有することが示されている<sup>6)</sup>。


## 18.4 メラニン生成に及ぼす影響

*in vitro*においてアスコルビン酸はドパキノン→ドパクロムの酸化還元系として作用してドパクロムの生成を阻害する成績が得られており、モルモット及びウサギに大量投与した場合にも*in vitro*で認められたドパクロム生成阻害を起こし得る量が皮膚へ到達することが認められている<sup>7)</sup>。

## 19. 有効成分に関する理化学的知見

一般名：アスコルビン酸（Ascorbic Acid）

構造式：



分子式：C<sub>6</sub>H<sub>8</sub>O<sub>6</sub>

分子量：176.12

化学名：L-threo-Hex-2-enono-1,4-lactone

性状：白色の結晶又は結晶性の粉末で、においはなく、酸味がある。水に溶けやすく、エタノール（95）にやや溶けにくく、ジエチルエーテルにほとんど溶けない。

融点：約190℃（分解）

**\*20. 取扱い上の注意**

アルミ袋開封後は、湿気を避けて保存すること。

**22. 包装**

(バラ) 500g 箱

**23. 主要文献**

- 1) 第十八改正日本薬局方解説書 廣川書店. 2021 : C-95-100
- 2) Fullmer, H. M., et al. : Ann. New York Acad. Sci. 1961 ; 92 : 286-294
- 3) 梶原章 : 最新医学. 1962 ; 17 : 1429-1446
- 4) Gould, B. S., et al. : J. Biol. Chem. 1957 ; 226 : 289-300
- 5) Priest, R. E. : Nature. 1970 ; 225 : 744-745
- 6) Bacchus, H., et al. : Science. 1951 ; 113 : 269-270
- 7) 竹内勝 ほか : ビタミン. 1963 ; 28 : 501-507

**24. 文献請求先及び問い合わせ先**

扶桑薬品工業株式会社 研究開発センター 学術室

〒536-8523 大阪市城東区森之宮二丁目3番30号

TEL 06-6964-2763 FAX 06-6964-2706

(9 : 00~17 : 30/土日祝日を除く)

**26. 製造販売業者等**

**26.1 製造販売元**



**扶桑薬品工業株式会社**

大阪市城東区森之宮二丁目3番11号