

外用局所収れん剤

亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」

ZINC OXIDE Simple Ointment

貯法：気密容器、室温保存

使用期限：4年
(容器に表示の使用期限内
に使用すること)

承認番号	16000AMZ04069
薬価収載	1985年8月
販売開始	1985年8月
再評価結果	1985年7月

【禁忌(次の部位には使用しないこと)】

重度または広範囲の熱傷〔酸化亜鉛が創傷部位に付着し、
組織修復を遅延させることがある。〕

【組成・性状】

組成

販売名	亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」
成分・含量 (1g中)	日局 酸化亜鉛 100mg
添加物	ダイズ油、ミツロウ、ジブチルヒドロキシトルエン

製剤の性状

本剤は白色～淡黄色の軟膏である。

【効能・効果】

- 下記皮膚疾患の収れん・消炎・保護・緩和な防腐
外傷、熱傷、凍傷、湿疹・皮膚炎、肛門そう痒症、白癬、
面皰、癬、よう(癬)
- その他の皮膚疾患によるびらん・潰瘍・湿潤面

【用法・用量】

通常、症状に応じ、1日1～数回、患部に塗擦又は貼布する。

【使用上の注意】

1. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査
を実施していない。

種類	頻度	頻度不明
過敏症 ^(注)	過敏症状	
皮膚 ^(注)	発疹、刺激感等	

注) このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

2. 適用上の注意

使用部位

眼には使用しないこと。

【薬効薬理】

皮膚のたん白質と結合して被膜を形成し、収れん、消炎、保護並び
に緩和な防腐作用を現す。また、浸出液の吸収及び分泌抑制により、
創面又は潰瘍面などを乾燥させる。酸化亜鉛の作用に加え、皮膚軟
化性(軟膏)及び皮膚密着性(軟膏・チンク油)を持ち痂皮を軟化し(軟
膏)、炎症を消退させ(チンク油)、肉芽形成・表皮形成を促進させ
て皮膚疾患を改善する(軟膏・チンク油)。

【有効成分に関する理化学的知見】

一般名：〔日局〕酸化亜鉛(Zinc Oxide)

〔日局別名〕亜鉛華

分子式：ZnO

分子量：81.41

性状：本品は白色の無晶性の粉末で、におい及び味はない。

本品は水、エタノール(95)、酢酸(100)又はジエチルエー
テルにほとんど溶けない。

本品は希塩酸又は水酸化ナトリウム試液に溶ける。

本品は空気中で徐々に二酸化炭素を吸収する。

【取扱い上の注意】

安定性試験：最終包装製品を用いた長期保存試験(室温保存、4年)
の結果、外観及び含量等は規格の範囲内であり、亜鉛華(10%)単軟
膏「ホエイ」は通常の市場流通下において4年間安定であることが
確認された¹⁾。

【包装】

500g

【主要文献】

- 社内資料 (安定性試験資料)

*【文献請求先】

「主要文献」に記載の社内資料につきましても下記にご請求ください。
ヴィアトリス製薬株式会社 メディカルインフォメーション部
〒105-0001 東京都港区虎ノ門5丁目11番2号
フリーダイヤル 0120-419-043

**製造販売元

ヴィアトリス・ヘルスケア合同会社

東京都港区虎ノ門5丁目11番2号

*販売元

ヴィアトリス製薬株式会社

東京都港区虎ノ門5丁目11番2号