

経皮吸収型鎮痛・消炎剤
日本薬局方 フェルビナクテープ

フェルビナクテープ[®]35mg「三笠」

フェルビナクテープ[®]70mg「三笠」

FELBINAC TAPE35mg/70mg「MIKASA」

貯法：遮光した気密容器、室温保存
使用期限：3年(外箱等の表示を参照。
使用期限内であっても開封
後はなるべく速やかに使用
すること。)
注意：開封後はチェックをしまして
保管すること。

	フェルビナクテープ35mg「三笠」	フェルビナクテープ70mg「三笠」
承認番号	30200.AMX.00535000	30200.AMX.00536000
薬価収載	2020年12月	2020年12月
販売開始	2020年12月	2020年12月

【禁忌(次の患者には使用しないこと)】

- (1)本剤又は他のフェルビナク製剤に対して過敏症の既往歴のある患者
- (2)アスピリン喘息(非ステロイド性消炎鎮痛剤等による喘息発作の誘発)又はその既往歴のある患者
[喘息発作を誘発するおそれがある。]

【組成・性状】

販売名	フェルビナクテープ 35mg「三笠」	フェルビナクテープ 70mg「三笠」
成分・含量 (1枚中)	日本薬局方 フェルビナク…35mg	日本薬局方 フェルビナク…70mg
添加物	香料、BHT、テルペン樹脂、スチレン・ イソプレン・スチレンブロック共重合体、 ポリブテン、ポリオキシエチレンポリオキ シプロピレングリコール、セバシン酸ジエ チル、炭酸プロピレン、流動パラフィン その他1成分	
色・剤形・ におい	膏体を支持体に展延し、膏体をライナーで 被覆した貼付剤である。ライナーを除き直 ちに観察するとき、膏体は微黄色半透明～ 黄色半透明で特異な芳香がある。	
大きさ (膏体質量)	7cm×10cm (0.7g)	10cm×14cm (1.4g)
識別コード	MZ-FBT35	MZ-FBT70

【効能又は効果】

下記疾患並びに症状の鎮痛・消炎
変形性関節症、肩関節周囲炎、腱・腱鞘炎、腱周囲炎、上
腕骨上顆炎(テニス肘等)、筋肉痛、外傷後の腫脹・疼痛

【用法及び用量】

1日2回患部に貼付する。

【使用上の注意】

1. 慎重投与(次の患者には慎重に使用すること)
気管支喘息のある患者
[喘息発作を誘発するおそれがある。]
2. 重要な基本的注意
(1)消炎鎮痛剤による治療は原因療法ではなく対症療法であ
ることに留意すること。
(2)皮膚の感染症を不顕性化するおそれがあるので、感染を
伴う炎症に対して用いる場合には適切な抗菌剤又は抗真
菌剤を併用し、観察を十分に行い慎重に使用すること。
(3)慢性疾患(変形性関節症等)に対し本剤を用いる場合に
は薬物療法以外の療法も考慮すること。また、患者の状態
を十分観察し、副作用の発現に留意すること。
3. 副作用
本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調
査を実施していない。
(1) 重大な副作用(頻度不明)
ショック、アナフィラキシー
ショック、アナフィラキシー(蕁麻疹、血管浮腫、

呼吸困難等)があらわれることがあるので、観察を
十分に行い、異常が認められた場合には使用を中止
し、適切な処置を行うこと。

- (2) その他の副作用
以下のような副作用があらわれた場合には、症状に
応じて使用を中止するなど適切な処置を行うこと。

	頻度不明
皮膚	皮膚炎(発疹、湿疹を含む)、痒痒、発赤、 接触皮膚炎、刺激感、水疱

* 4. 妊婦、産婦、授乳婦等への使用

- (1)妊婦又は妊娠している可能性のある女性に対しては
治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合
にのみ使用すること。[妊娠中の使用に関する安全性
は確立していない。]
- (2)シクロオキシゲナーゼ阻害剤(経口剤、坐剤)を妊婦
に使用し、胎児の腎機能障害及び尿量減少、それに伴
う羊水過少症が起きたとの報告がある。

5. 小児等への使用

小児等に対する安全性は確立していない(使用経験が少
ない)。

6. 適用上の注意

- 使用部位
- 1) 損傷皮膚及び粘膜に使用しないこと。
 - 2) 湿疹又は発疹の部位に使用しないこと。

【薬効薬理】

1. 鎮痛作用¹⁾


ラット炎症足圧痛刺激抑制試験において、フェルビナク含有
貼付剤と同等な効果を示し、また、無処置対照群及び基剤
群と比較して有意な鎮痛作用を示した。

2. 抗炎症作用¹⁾

ラットカラゲニン足蹠浮腫抑制試験、ラット肉芽腫形成抑制
試験において、フェルビナク含有貼付剤と同等な効果を示し、
また、無処置対照群及び基剤群と比較して有意な抗炎症
作用を示した。

【有効成分に関する理化学的知見】

一般名：フェルビナク (Felbinac) [JAN]
化学名：Biphenyl-4-ylacetic acid
分子式：C₁₄H₁₂O₂
分子量：212.24
融点：163～166℃
構造式：



性状：白色～微黄白色の結晶又は結晶性の粉末である。
メタノール又はアセトンにやや溶けやす
く、エタノール(95)にやや溶けにくく、水
にほとんど溶けない。

