

※※2023年5月改訂(第10版)
※2022年2月改訂

アンジオテンシン変換選択性阻害剤

日本薬局方 イミダプリル塩酸塩錠

日本標準商品分類番号

872144

処方箋医薬品^(注)

イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「ケミファ」

イミダプリル塩酸塩錠5mg「ケミファ」

イミダプリル塩酸塩錠10mg「ケミファ」

Imidapril

貯法 : 気密容器(室温保存)
開封後は湿気を避けて
保存すること
使用期限 : 外箱に表示(3年)
注) 注意—医師等の処方箋によ
り使用すること

	錠2.5mg	錠5mg	錠10mg
承認番号	22000AMX01687000	22000AMX01688000	22000AMX01689000
薬価収載	2008年11月	2008年11月	2008年11月
販売開始	2008年11月	2008年11月	2008年11月
効能追加	2012年12月	2012年12月	——

●禁忌(次の患者には投与しないこと)

- (1)本剤の成分に対し、過敏症の既往歴のある患者
- (2)血管浮腫の既往歴のある患者(アンジオテンシン変換酵素阻害剤等の薬剤による血管浮腫、遺伝性血管浮腫、後天性血管浮腫、特発性血管浮腫等)
[呼吸困難を伴う血管浮腫を発現することがある。]
- (3)デキストラン硫酸固定化セルロース、トリプトファン固定化ポリビニルアルコール又はポリエチレンテレフタレートを用いた吸着器によるアフェレーシスを施行中の患者
[ショックを起こすことがある。]([3.相互作用]の項参照)
- (4)アクリロニトリルメタリルスルホン酸ナトリウム膜(AN69[®])を用いた血液透析施行中の患者
[アナフィラキシーを発現することがある。]([3.相互作用]の項参照)
- (5)妊娠又は妊娠している可能性のある女性([6.妊娠、産婦、授乳婦等への投与]の項参照)
- (6)アリスクリンフル酸塩を投与中の糖尿病患者(ただし、他の降圧治療を行ってもなお血圧のコントロールが著しく不良の患者を除く)
[非致死性脳卒中、腎機能障害、高カリウム血症及び低血圧のリスク増加が報告されている。]([2.重要な基本的注意]の項参照)
- ※ (7)サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物を投与中の患者、又は投与中止から36時間以内の患者
[血管浮腫があらわれるおそれがある。]([3.相互作用]の項参照)

販売名	サイズ	表	裏	側面	識別コード
イミダプリル 塩酸塩錠 2.5mg「ケミファ」	直径5.5mm 厚さ2.5mm 重量約60mg	(MED 224)	(2.5)	()	MED 224
イミダプリル 塩酸塩錠 5mg「ケミファ」	直径6.0mm 厚さ2.7mm 重量約80mg	(MED 225)	(5)	()	MED 225
イミダプリル 塩酸塩錠 10mg「ケミファ」	直径6.5mm 厚さ2.8mm 重量約90mg	(MED 226)	(10)	()	MED 226

●効能又は効果

- <イミダプリル塩酸塩錠2.5mg/5mg「ケミファ」>
高血圧症、腎実質性高血圧症、1型糖尿病に伴う糖尿病性腎症
<イミダプリル塩酸塩錠10mg「ケミファ」>
高血圧症、腎実質性高血圧症

●用法及び用量

○高血圧症、腎実質性高血圧症

通常、成人にはイミダプリル塩酸塩として5～10mgを1日1回経口投与する。
なお、年齢、症状により適宜増減する。ただし、重症高血圧症、腎障害を伴う高血圧症又は腎実質性高血圧症の患者では2.5mgから投与を開始することが望ましい。

○1型糖尿病に伴う糖尿病性腎症

<イミダプリル塩酸塩錠2.5mg/5mg「ケミファ」>

通常、成人にはイミダプリル塩酸塩として5mgを1日1回経口投与する。ただし、重篤な腎障害を伴う患者では2.5mgから投与を開始することが望ましい。

<用法及び用量に関連する使用上の注意>

クレアチニンクリアランスが30mL/分以下、又は血清クレアチニンが3mg/dL以上の重篤な腎機能障害のある患者では、投与量を半量にするか、若しくは投与間隔をのばすなど慎重に投与すること。

[排泄の遅延による過度の血圧低下及び腎機能を悪化させるおそれがある。]([1.慎重投与]の項参照)

●組成・性状

1. 組成

販売名	イミダプリル塩酸塩 錠2.5mg「ケミファ」	イミダプリル塩酸塩 錠5mg「ケミファ」	イミダプリル塩酸塩 錠10mg「ケミファ」
1錠中の有効成分	(日局) イミダプリル塩酸塩		
	2.5mg	5mg	10mg
添加物	ステアリン酸マグネシウム、乳糖水和物、ポリビニルアルコール(部分けん化物)		

2. 製剤の性状

イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「ケミファ」は、白色の素錠であり、イミダプリル塩酸塩錠5mg「ケミファ」及びイミダプリル塩酸塩錠10mg「ケミファ」は、白色の割線入り素錠である。

●使用上の注意

1. 慎重投与(次の患者には慎重に投与すること)

- (1)両側性腎動脈狭窄のある患者又は片腎で腎動脈狭窄のある患者([2.重要な基本的注意]の項参照)
- (2)高カリウム血症の患者([2.重要な基本的注意]の項参照)
- (3)腎機能障害のある患者(<用法及び用量に関連する使用上の注意>及び[4.副作用](1)重大な副作用]の項参照)

(4)脳血管障害のある患者

[過度の降圧が脳血流不全を惹起し、病態を悪化させることがある。]

(5)高齢者(「5.高齢者への投与」の項参照)

2. 重要な基本的注意

(1)両側性腎動脈狭窄のある患者又は片腎で腎動脈狭窄のある患者においては、腎血流量の減少や糸球体ろ過圧の低下により急速に腎機能を悪化させるおそれがあるので、治療上やむを得ないと判断される場合を除き、使用は避けること。

(2)高カリウム血症の患者においては、高カリウム血症を増悪させるおそれがあるので、治療上やむを得ないと判断される場合を除き、使用は避けること。

また、腎機能障害、コントロール不良の糖尿病等により血清カリウム値が高くなりやすい患者では、高カリウム血症が発現するおそれがあるので、血清カリウム値に注意すること。

(3)アリスクリンフマル酸塩を併用する場合、腎機能障害、高カリウム血症及び低血压を起こすおそれがあるため、患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。なお、eGFRが60mL/min/1.73m²未満の腎機能障害のある患者へのアリスクリンフマル酸塩との併用については、治療上やむを得ないと判断される場合を除き避けること。

(4)1型糖尿病に伴う糖尿病性腎症の場合、投与初期(1ヶ月以内)に急速に腎機能の悪化や高カリウム血症が発現するおそれがあるので、投与初期は血清クレアチニン値及び血清カリウム値を測定し、急速な腎機能の悪化や血清カリウム値の上昇が認められた場合には減量あるいは投与中止などの適切な処置を行うこと。

(5)本剤の投与により、次の患者では、初回投与後一過性の急激な血压低下を起こす場合があるので、投与は少量より開始し、增量する場合は患者の状態を十分に観察しながら徐々に行うこと。

1) 重症の高血圧症患者

2) 血液透析中の患者

3) 利尿降圧剤投与中の患者(特に最近利尿降圧剤投与を開始した患者)

4) 嚫重な減塩療法中の患者

(6)降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。

(7)手術前24時間は投与しないことが望ましい。

3. 相互作用

(1)併用禁忌(併用しないこと)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
デキストラン硫酸固定化セルロース、トリプトファン固定化ポリビニルアルコール又はポリエチレンテレフタレートを用いた吸着器によるアフェレーシスの施行 リポソーバー [®] イムソーバーTR [®] セルソーバー等	ショックを起こすことがある。	陰性に荷電したデキストラン硫酸固定化セルロース、トリプトファン固定化ポリビニルアルコール又はポリエチレンテレフタレートにより血中キニン系の産生が亢進し、更に本剤によりブラジキニンの代謝が妨げられて、ブラジキニンが蓄積すると考えられる。
アクリロニトリルメタリルスルホン酸ナトリウム膜を用いた透析 AN69 [®]	アナフィラキシーを発現することがある。	多価イオン体であるAN69 [®] により血中キニン系の産生が亢進し、更に本剤によりブラジキニンの代謝が妨げられて、ブラジキニンが蓄積すると考えられる。

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
※ アリスクリンフマル酸塩(ラジレス)(糖尿病患者に使用する場合。ただし、他の降圧治療を行ってもなお血压のコントロールが著しく不良の患者を除く)	非致死性脳卒中、腎機能障害、高カリウム血症及び低血压のリスク増加が報告されている。	併用によりレニン・アンジオテンシン系阻害作用が増強される可能性がある。
※ サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物(エンレスト)	血管浮腫があらわれるおそれがある。左記薬剤を投与する場合は、本剤を少なくとも36時間前に中止すること。また、左記薬剤の投与終了後に本剤を投与する場合は、36時間以上の間隔をあけること。	併用により相加的にブラジキニンの分解を抑制し、血管浮腫のリスクを増加させる可能性がある。

(2)併用注意(併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
カリウム保持性利尿剤(スピロノラクトントリアムテレン等) カリウム補給剤(塩化カリウム等)	血清カリウム値が上昇することがある。併用する場合は血清カリウム値に注意すること。	本剤はアンジオテンシンII産生を抑制し、アルドステロンの分泌を低下させるため、カリウム排泄を減少させると考えられる。腎機能障害のある患者には特に注意する。
アリスクリンフマル酸塩	腎機能障害、高カリウム血症及び低血压を起こすおそれがあるため、腎機能、血清カリウム値及び血压を十分に観察すること。 なお、eGFRが60mL/min/1.73m ² 未満の腎機能障害のある患者へのアリスクリンフマル酸塩との併用については、治療上やむを得ないと判断される場合を除き避けること。	併用によりレニン・アンジオテンシン系阻害作用が増強される可能性がある。
利尿降圧剤(トリクロルメチアジド ヒドロクロロチアジド等)	利尿降圧剤で治療中の患者に本剤を初めて投与する場合、降圧作用が増強するおそれがあるので少量より投与するなど慎重に投与すること。	利尿剤の投与は血漿レニン活性を上昇させているため、本剤の投与により急激な血压低下を起こすと考えられる。

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
リチウム製剤 (炭酸リチウム)	リチウム中毒(眠気、振戦、錯乱等)を起こすことがある。 定期的にリチウムの血中濃度を測定し、異常があれば減量若しくは投与中止する。	腎尿細管におけるリチウムの再吸収を促進すると考えられる。
非ステロイド性抗炎症剤 (インドメタシン等)	降圧作用が減弱することがある。 定期的に血圧を観察し、適切な処置をする。	非ステロイド性抗炎症剤のプロスタグランジン合成阻害作用により、本剤の降圧作用を減弱させると考えられる。
	腎機能を悪化させるおそれがある。異常が認められた場合には、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。	非ステロイド性抗炎症剤のプロスタグランジン合成阻害作用により、腎血流量が低下するためと考えられる。
カリジノゲナーゼ製剤	本剤との併用により過度の血圧低下が引き起こされる可能性がある。	本剤のキニン分解抑制作用とカリジノゲナーゼ製剤のキニン産生作用により、血管平滑筋の弛緩が増強すると考えられる。
他の降圧作用を有する薬剤 (降圧剤 硝酸剤等)	降圧作用が増強することがある。 定期的に血圧を測定し、両剤の用量を調節する。	相加的に作用(降圧作用)を増強させると考えられる。

4. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

(1)重大な副作用(頻度不明)

- 1)呼吸困難を伴う顔面、舌、声門、喉頭の腫脹を症状とする血管浮腫があらわれることがあるので、異常が認められた場合には直ちに投与を中止し、抗ヒスタミン剤、副腎皮質ホルモン剤の投与及び気道確保等の適切な処置を行うこと。
- 2)重篤な血小板減少があらわれることがあるので、このような場合には直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- 3)急性腎障害、また、腎機能障害の増悪があらわれることがあるので、腎機能検査を行うなど観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。
- 4)重篤な高カリウム血症があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、直ちに適切な処置を行うこと。
- 5)紅皮症(剥脱性皮膚炎)、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、天疱瘡様症状があらわれることがあるので、紅斑、水疱、そう痒、発熱、粘膜疹等があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

(2)重大な副作用(類薬)

- 1)他のアンジオテンシン変換酵素阻害剤で、汎血球減少があらわれたとの報告があるので、このような異常が認められた場合には直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- 2)他のアンジオテンシン変換酵素阻害剤で、脾炎があらわれたとの報告があるので、血中のアミラーゼ、リパーゼの上昇等が認められた場合には、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

(3)その他の副作用

副作用が認められた場合には、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

	頻度不明
血 液	赤血球減少、ヘモグロビン減少、ヘマトクリット減少、血小板減少、白血球減少、好酸球增多
腎 臓	血清クレアチニン上昇、BUN上昇、蛋白尿
精神神経系	頭痛、ふらつき、めまい、立ちくらみ、不眠、眠気
循 環 器	低血圧、動悸
呼 吸 器	咳、咽頭部異和感・不快感、痰、嘔声
消 化 器	悪心、嘔気、嘔吐、胃部不快感、腹痛、食欲不振、下痢
肝 臓	AST(GOT) 上昇、ALT(GPT) 上昇、AI-P上昇、LDH上昇、黄疸、γ-GTP上昇
過 敏 症	発疹、そう痒、光線過敏症、尋麻疹
そ の 他	血清カリウム上昇、耳鳴、味覚異常、口渴、CK(CPK)上昇、胸部不快感、疲労、倦怠感、浮腫、顔面潮紅、脱毛、しづれ、脱力感、低血糖

5. 高齢者への投与

低用量(例えは2.5mg)から投与を開始するなど、患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。

(1)本剤は主として腎臓から排泄されるが、一般に高齢者では腎機能が低下していることが多いため高い血中濃度が持続するおそれがあり、副作用が発現又は作用が増強しやすい。

(2)高齢者では一般に過度の降圧は好ましくないとされている(脳梗塞等が起こるおそれがある)。

6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

※※(1)妊娠又は妊娠している可能性のある女性には投与しないこと。また、投与中に妊娠が判明した場合には、直ちに投与を中止すること。

[妊娠中期及び末期にアンジオテンシン変換酵素阻害剤又はアンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤を投与された患者で羊水過少症、胎児・新生児の死亡、新生児の低血圧、腎不全、高カリウム血症、頭蓋の形成不全及び羊水過少症によると推測される四肢の拘縮、頭蓋顔面の変形、肺の低形成等があらわれたとの報告がある。また、海外で実施されたレトロスペクティブな疫学調査で、妊娠初期にアンジオテンシン変換酵素阻害剤を投与された患者群において、胎児奇形の相対リスクは降圧剤が投与されていない患者群に比べ高かったとの報告がある。]

※※(2)妊娠する可能性のある女性に投与する場合には、本剤の投与に先立ち、代替薬の有無等も考慮して本剤投与の必要性を慎重に検討し、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。また、投与が必要な場合には次の注意事項に留意すること。

1)本剤投与開始前に妊娠していないことを確認すること。
本剤投与中も、妊娠していないことを定期的に確認すること。
投与中に妊娠が判明した場合には、直ちに投与を中止すること。

2)次の事項について、本剤投与開始時に患者に説明すること。
また、投与中も必要に応じ説明すること。

- ・妊娠中に本剤を使用した場合、胎児・新生児に影響を及ぼすリスクがあること。
- ・妊娠が判明した又は疑われる場合は、速やかに担当医に相談すること。
- ・妊娠を計画する場合は、担当医に相談すること。

[妊娠していることが把握されずアンジオテンシン変換酵素阻害剤又はアンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤を使用し、胎児・新生児への影響(腎不全、頭蓋・肺・腎の形成不全、死亡等)が認められた例が報告されている^{1), 2)}]

3)授乳中の女性に投与することを避け、やむを得ず投与する場合には、授乳を中止させること。

[動物実験(ラット)で乳汁中へ移行することが認められてい

る。]

7. 小児等への投与

小児等に対する安全性は確立していない(使用経験がない)。

8. 適用上の注意

薬剤交付時：PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。

[PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔を起こして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている。]

9. その他の注意

インスリン又は経口血糖降下剤の投与中にアンジオテンシン変換酵素阻害剤を投与することにより、低血糖が起こりやすいとの報告がある。

●薬物動態

1. 生物学的同等性試験³⁾


(1)イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「ケミファ」

イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「ケミファ」と標準製剤を、クロスオーバー法によりそれぞれ1錠(イミダプリル塩酸塩として2.5mg)健康成人男子に絶食単回経口投与して血漿中未変化体濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ(AUC、Cmax)について90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、両剤の生物学的同等性が確認された。

各製剤1錠投与時の薬物動態パラメータ

	C _{max} (ng/mL)	T _{max} (hr)	t _{1/2} (hr)	AUC _{0-12hr} (ng·hr/mL)
イミダプリル塩酸塩錠 2.5mg「ケミファ」	6.72±2.91	2.2±0.6	1.5±0.3	32.02±12.52
標準製剤 (錠剤、2.5mg)	6.43±2.49	2.4±0.7	1.5±0.2	30.94±11.54

(Mean±S.D., n=24)




(2)イミダプリル塩酸塩錠5mg「ケミファ」

イミダプリル塩酸塩錠5mg「ケミファ」と標準製剤を、クロスオーバー法によりそれぞれ1錠(イミダプリル塩酸塩として5mg)健康成人男子に絶食単回経口投与して血漿中未変化体濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ(AUC、Cmax)について90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、両剤の生物学的同等性が確認された。

各製剤1錠投与時の薬物動態パラメータ

	C _{max} (ng/mL)	T _{max} (hr)	t _{1/2} (hr)	AUC _{0-12hr} (ng·hr/mL)
イミダプリル塩酸塩錠 5 mg「ケミファ」	14.22±5.96	2.4±0.5	1.5±0.3	66.58±24.04
標準製剤 (錠剤、5 mg)	13.94±6.83	2.4±0.6	1.6±0.6	67.10±27.62

(Mean±S.D., n=40)




(3)イミダプリル塩酸塩錠10mg「ケミファ」

イミダプリル塩酸塩錠10mg「ケミファ」と標準製剤を、クロスオーバー法によりそれぞれ1錠(イミダプリル塩酸塩として10mg)健康成人男子に絶食単回経口投与して血漿中未変化体濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ(AUC、Cmax)について90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、両剤の生物学的同等性が確認された。

各製剤1錠投与時の薬物動態パラメータ

	C _{max} (ng/mL)	T _{max} (hr)	t _{1/2} (hr)	AUC _{0-12hr} (ng·hr/mL)
イミダプリル塩酸塩錠 10mg「ケミファ」	33.05±18.07	2.1±0.5	1.6±0.3	144.68±70.89
標準製剤 (錠剤、10mg)	30.70±15.65	2.4±0.9	1.5±0.2	136.16±56.18

(Mean±S.D., n=16)



血漿中濃度並びにAUC、Cmax等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

2. 溶出挙動⁴⁾

本製剤は、日本薬局方医薬品各条に定められたイミダプリル塩酸塩錠の溶出規格に適合していることが確認されている。

●薬効薬理

イミダプリル塩酸塩はプロドラッグであり、経口投与後、加水分解により活性代謝物のジアシド体(イミダプリラート)に変換され、このイミダプリラートがアンジオテンシン変換酵素阻害薬として働く。アンジオテンシン変換酵素阻害薬は、生理活性を持たないアンジオテンシンⅠから強力な昇圧活性を有するアンジオテンシンⅡへの変換を阻害することにより、血圧降下作用を示す。

●有効成分に関する理化学的知見


一般名：イミダプリル塩酸塩(Imidapril Hydrochloride)

化学名：(4S)-3-[(2S)-2-[(1S)-1-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropylamino]propanoyl]-1-methyl-2-oxoimidazolidine-4-carboxylic acid monohydrochloride

分子式：C20H27N3O6 · HCl

分子量：441.91

構造式：



性 状：イミダプリル塩酸塩は白色の結晶である。

本品はメタノールに溶けやすく、水にやや溶けやすく、エタノール(99.5)にやや溶けにくい。

本品1.0gを水100mLに溶かした液のpHは約2である。

融 点：約203°C(分解)

●取扱い上の注意

安定性試験⁶⁾

PTP包装(PTPシートをアルミピロー包装(乾燥剤入り))したもの用いた加速試験(40°C、相対湿度75%、6ヶ月)の結果、通常の市場流通下において3年間安定であることが推測された。

●包装

イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「ケミファ」：100錠(10錠×10)

イミダプリル塩酸塩錠5mg「ケミファ」： 100錠(10錠×10)

140錠(14錠×10)

500錠(10錠×50)

イミダプリル塩酸塩錠10mg「ケミファ」：100錠(10錠×10)

●主要文献

※※1) 阿部真也 他：周産期医学。2017；47：1353-1355

※※2) 齊藤大祐 他：鹿児島産科婦人科学会雑誌。2021；29：49-54

3) メディサ新薬(株)：生物学的同等性に関する資料(社内資料)

4) メディサ新薬(株)：溶出に関する資料(社内資料)

5) 第十八改正日本薬局方解説書 C-665, 廣川書店, 東京, 2021

6) メディサ新薬(株)：安定性に関する資料(社内資料)

●文献請求先

主要文献に記載の社内資料につきましても下記にご請求ください。

日本ケミファ株式会社 安全管理部

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2丁目2番3号

TEL 0120-47-9321 03-3863-1225

FAX 03-3861-9567

販売元
日本ケミファ株式会社
東京都千代田区岩本町2丁目2-3

製造販売元
メディサ新薬株式会社
大阪市淀川区宮原5丁目2-27