

貯 法：遮光した気密容器
使用期限：ラベルに記載

日本標準商品分類番号
872399

承認番号	16000AMZ05382000
薬価収載	1985年12月
販売開始	1985年12月

口腔用剤

日本薬局方 複方ヨード・グリセリン
複方ヨード・グリセリン「ヤクハン」
COMPOUND IODINE GLYCERIN

【禁忌（次の患者には使用しないこと）】
本剤又はヨウ素に対し過敏症の既往歴のある患者

【組成・性状】

1. 組成

販売名	複方ヨード・グリセリン「ヤクハン」
有効成分	100mL中 日局ヨウ素 1.2g
	100mL中 日局液状フェノール 0.5mL
	100mL中 日局グリセリン 90mL
添加物	100mL中 ヨウ化カリウム2.4g、ハッカ水4.5mL

2. 性状

販売名	複方ヨード・グリセリン「ヤクハン」
剤形・性状	赤褐色粘稠性の液で、特異なおいがある。

【効能・効果】

咽頭炎、喉頭炎、扁桃炎

【用法・用量】

症状に応じ、適宜適量を患部に塗布する。

【使用上の注意】

1. 相互作用

併用禁忌（併用しないこと）

薬剤名	機序・危険因子
水銀剤	ヨウ化水銀が発生するおそれがある。

2. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

(1)重大な副作用

アナフィラキシー様症状

他のヨード製剤においてアナフィラキシー様症状（呼吸困難、潮紅、蕁麻疹等）（頻度不明）があらわれることがあるとの報告があるので、このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

(2)その他の副作用

	頻度不明
過 敏 症 ^注	発疹、口腔粘膜び爛等
甲 状 腺	血中甲状腺ホルモン値（T ₃ 、T ₄ 等）の上昇あるいは低下などの甲状腺機能異常

注）このような症状があらわれた場合には、使用を中止すること。

3. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

他のヨード製剤において、先天性甲状腺機能低下症の乳児の報告があるので妊娠中及び授乳中の婦人には、長期にわたる広範囲の使用はさけること。

【包 装】

500mL（ガラス瓶）

*【文献請求先】

日医工株式会社 お客様サポートセンター
〒930-8583 富山市総曲輪1丁目6番21
フリーダイヤル（0120）517-215
Fax（076）442-8948

*
販売元
**日医工株式会社**
NICHIKO 富山市総曲輪1丁目6番21

製造販売元

ヤクハン製薬株式会社
北海道北広島市北の里27番地