

貯 法：遮光した気密容器、火気を避けて保存
使用期限：容器底部に記載

承認番号	22000AMX00672000
薬価収載	2008年6月
販売開始	1997年7月

外用殺菌消毒剤

ハイポアルコール液2% 「ヤクハン」

2w/v%チオ硫酸ナトリウム・エタノール液

【禁忌】（次の部位には使用しないこと）
損傷皮膚及び粘膜 [刺激作用がある。]

【包 装】

500mL（丸型減容）

****【文献請求先】**

日医工株式会社 お客様サポートセンター
〒930-8583 富山市総曲輪1丁目6番21
フリーダイヤル (0120) 517-215
Fax (076) 442-8948

【組成・性状】

1. 組成

本品100mL中、下記の成分を含有する。

有効成分	日局チオ硫酸ナトリウム水和物 (Na ₂ S ₂ O ₃ ・5H ₂ O) 2g
添加物	日局エタノール 65mL、炭酸ナトリウム 適量

2. 製剤の性状

本品は無色澄明な液で特異臭がある。
本品は水と混和する。
本品は点火するとき、淡青色の炎をあげて燃える。
本品は揮発性である。
本品の水溶液（1→5）のpHは9.5～10.2である。

【効能・効果】【用法・用量】

効能・効果	皮膚面及び手術用器具類・布類に付着したヨードチンキ類のヨウ素の脱色、消毒
用法・用量	ヨードチンキ塗布による皮膚面（手術部位及び手術者の皮膚）及び手術用器具類・布類に付着したヨウ素の脱色並びに消毒剤として塗布又は洗浄等にそのまま使用する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1)本剤が眼に入らないように注意すること。眼に入った場合には、直ちによく水洗すること。
- (2)広範囲又は長期間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。[エタノール蒸気に大量に又は繰り返しさらされた場合、粘膜への刺激、頭痛等を起こすことがある。]

2. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

	頻度不明
過敏症 ^{注)}	発疹等
皮膚 ^{注)}	刺激症状

注) このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

3. 適用上の注意

(1)投与経路

外用にのみ使用すること。

(2)使用時

- 1)注射用の消毒には使用しないこと。
- 2)同一部位（皮膚面）に反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。
- 3)本剤は血清、膿汁等のたん白質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している医療器具等に用いる場合には、十分に洗い落としてから使用すること。
- * 4)引火性、爆発性があるため、火気（電気メス使用等も含む）には十分注意すること。

【取扱い上の注意】

1. 結晶が析出した場合には、少し加温して溶解する。
2. 合成ゴム製品、合成樹脂製品、光学器具、鏡器具、塗装カテーター等には、変質するものがあるので、このような器具は長時間浸漬しないこと。

**** 安定性試験**

最終包装製品を用いた長期保存試験（25℃、25ヵ月）の結果、通常の市場流通下において2年間安定であることが確認された。

**

販売元
日医工株式会社
NICHIKO 富山市総曲輪1丁目6番21

製造販売元

ヤクハン製薬株式会社
北海道北広島市北の里27番地