

【使用上の注意】

1. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

(1) 過敏症(頻度不明): 発疹等の過敏症状^{注)}

(2) 皮膚(頻度不明): 刺激症状^{注)}

注) このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

2. 臨床検査結果に及ぼす影響

注射部位に発赤を起こすことがあるので、アレルギーテストの判断を妨害することがある。

3. 適用上の注意

(1) 人体

- 1) 外用にのみ使用すること。
- 2) 眼に入らないよう注意すること。入った場合には水でよく洗い流すこと。
- 3) 広範囲又は長期間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。
- 4) 同一部位に反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。

(2) その他

本剤は血清、膿汁等のたんぱく質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している医療器具等に用いる場合には、十分に洗い落としてから使用すること。

【薬効薬理】 使用濃度において栄養型細菌(グラム陽性菌、グラム陰性菌)、酵母菌、ウイルス等には有効であるが、芽胞(炭疽菌、破傷風菌等)及び一部のウイルスに対する殺菌効果は期待できない。

【取扱い上の注意】 火気を避けて保管すること。

アルコール類・危険等級II・水溶性 **火気厳禁** **飲用不可**

外皮用殺菌消毒剤

山善消アル

Yamazen Alcohol for Disinfection



製造販売元



山善製薬株式会社

大阪市中央区道修町2丁目2番4号

2008年5月改訂

日本標準商品分類番号 872615

貯法等: 室温保存
気密容器

「取扱い上の注意」参照

承認番号 12727KUZ10130000

薬価収載 1983年5月

販売開始 1952年10月

再評価結果 1983年4月

【禁忌】 (次の部位には使用しないこと)
損傷皮膚及び粘膜(刺激作用を有するため)

【組成・性状】

本品100mL中、下記成分・分量を含有する。

日局 エタノール 63.5mL

日局 イソプロパノール 10.5mL

本品は無色澄明の液で、特異なにおいがある。

比重 d_{20}^{20} : 0.870~0.890

【効能・効果】

手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒

【用法・用量】

そのまま塗擦、清浄用として用いる。

本品は減容容器を使用しています。

製造番号

使用期限

GS1-RSS

4

987296

245154

(01)14987296245151



ボトル

(HE1)A