

【使用上の注意】

1. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

過敏症(頻度不明):発赤、発疹等の過敏症状(注)

(注)このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

2. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊娠中の投与に関する安全性は確立していないので、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にだけ投与する。
[使用経験が少ない。]

3. 小児等への投与

未熟児、新生児、乳児又は小児に対する安全性は確立していない。[使用経験が少ない。]

4. 適用上の注意

- (1) 湿潤面への使用は避けること。
- (2) 眼又は眼の周囲には使用しないこと。

【取扱い上の注意】

〈貯法〉気密容器に入れ、火気を避けて保存する。

アルコール類・危険等級Ⅱ・水溶性 **火気厳禁**



外用消炎・鎮痛・鎮痒剤

カンフル精

Camphor Spirit

500mL

発売元 **東海製薬株式会社**
名古屋市中川区江松一丁目105

製造販売元 **山善製薬株式会社**
大阪府中央区道修町2丁目2番4号

2016年6月改訂

貯法：室温保存
気密容器

「使用上の注意」の項参照

日本標準商品分類番号 872645

承認番号 14600AMZ02359000
(薬価基準収載)

販売開始 1982年2月
再評価結果 1982年1月

【組成・性状】

本品 100mL中、日局 d1-カンフル 10g、日局エタノール 84mL を含有する。

本品は無色澄明の液でカンフルの香気を有する。

【効能・効果】

下記疾患における局所刺激、血行の改善、消炎、鎮痛、鎮痒

筋肉痛、挫傷、打撲、捻挫、凍傷(第1度)、凍瘡、皮膚瘙癢症

【用法・用量】

通常、患部に適量を塗布あるいは塗擦する。

製造番号

使用期限

レコーダ

レコーダ



キャップ中栓外装フィルム